

56. VARSTVO VINSKE TRTE - 31.05.2022 22:10 - Zaključeno



Vinska trta pričenja s cvetenjem (60 – 62 po lestvici BBCH).

S nestanovitnimi vremenskimi razmerami priporočamo za varstvo pred *peronosporo vinske trte* sredstva s kombiniranim načinom delovanja: **MIKAL FLASH** (4 kg/ha) ali **MOMENTUM F** (4 kg/ha), pri katerih je predvidena trikratna zaporedna uporaba; oz. druge kombinirane pripravke kot so: **REBOOT** (0,4 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **CYMBAL** (0,25 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXSTRAWDG** (1,5 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **VALIS F** (2 kg/ha), **SANVINO** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha), **PERGADO F** (1,25 kg/ha), **ORONDIS** (0,32 l/ha), **ZORVEC ZELAMN** (0,6 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **MDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **DELAN PRO** (3 l/ha), **FOSHIELD** (v kombinaciji z drugimi dotikalnimi fungicidi, po navodilu za uporabo),

V primeru *neurja s točo* je potrebno najprej počakati, da se vinograd osuši, potem uporabite pripravke **na osnovi aktivne snovi folpet** (Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Mikal Flash, Momentum F, Pergado F, Twingo,...) **ali bakra**.

Proti *oidiji vinske trte* priporočamo: **DYNALI** (0,65 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 – 0,6 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **KUSABI 300 SC** (v času cvetenja 0,25 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,2 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **ORIUS 25 EW** (0,4 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (do nastavka plodiča 0,375 l/ha), **LUNAMAX** (1 l/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha),... Na ostalih površinah lahko še vedno dodate le **PRIPRAVKE NA OSNOVI MOČLJIVEGA**, oz. **TEKOČEGAŽVEPLA**.

Vinogradnikom svetujemo še spremljanje prisotnosti *gosenic grozdnih sukačev* na kabrnkih. V primeru preražmnožitve zaščitite pridelek s pripravkom **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha),...

Med rednim spremljanjem razvoja *ameriškega škržatka*, prenašalca karantenske bolezni *zlata trsna rumenica* smo začetek izleganja ličink zabeležili 18.05.2022. Ustrezen čas za uporabo insekticidov za njegovo zatiranje bomo sporočili pravočasno, po zaključenem cvetenju vinske trte in njegovem zaključenem izleganju iz zimskih jajčec.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 31.05.2022 22:10

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

