



57. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 31.05.2022 22:11 - Zaključeno



V nasadih jablan in hrušk so plodiči v premeru večji od 30 mm (73 po lestvici BBCH).

Nedavna možnost za okužbo z zimskimi sporami **jablanovega škrlupa** je potekala v močni jakosti okužbe 28.05.2022. V tem času sicer beležimo postopno upadanje koncentracije sproščenih askospor. Po nedavnem padavinskem obdobju je bila zaščitna obloga verjetno izprana in je poleg preventivnih fungicidov: **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **MERPLUS** (2 l/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha),... potrebno dodati tudi sredstvo z zdravilnim učinkovanjem za nazaj. Pripravke s kurativnim delovanjem morate dodati tudi v primeru, da imate v nasadu zaznane okužbe na listih, oz. plodovih: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **REYONA** (2,34 l/ha), **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **SCALA** (1,125 l/ha), **BATALION** (0,7-1,0 l/ha), **PYRAMID** (1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha). **FABAN** (1,2 l/ha) lahko uporabite samostojno. V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Pri občutljivih sortah na **jablanovo pepelovko** ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) svetujemo **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **REYONA** (2 l/ha), **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha), **SERCADIS** (0,25 l/ha). Možna je tudi raba: **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO** (100-150 g/ha), **TERCEL** (2,5 kg/ha), **TOPAS 100 EC** (0,5 l/ha), **TOPAZE** (0,5 l/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (3,3 l/ha) ali pripravkov na osnovi **MOČLJIVEGA ŽVEPLA**.

Za varstvo pred **jabolčnim zavijačem** pridejo v poštev **CORAGEN** (18 ml/hl; 0,27 l/ha) ali **VOLIAM** (18 ml/hl), oz. **MADEX MAX** (50 ml/ha na meter višine krošnje) ali **CARPOVIRUSINE** (1 l/ha), ki sta primerna tudi za ekološko pridelavo. Uporabite lahko še **EXIREL** (največ 0,9 l/ha) ali **MIMIC** (0,9 – 1 l/ha). Ocenjujemo, da bo potrebno skladno z dinamiko naleta metuljev, 10 – 12 dni po prvem tretiranju nanos ponoviti.

Precej sta zastopana še **breskov** in **slivov zavijač**, proti katerima učinkujejo že naštetih pripravki, z izjemo a.s. virusa granuloze *Cydia pomonella*. V tem primeru je smiselno uporabiti tudi **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha).

V primeru prerezamnožitev **rdeče sadne pršice** ali **navadne pršice** ukrepajte s: **SHIRUDO** (0,5 kg/ha), **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje) ali **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha).

Kolonije **krvavi uši** se selijo v višje predele krošenj dreves. Prag škodljivosti je pri 5-8 % napadenih vejah, oz. opaženih 12-tih kolonijah na 100 poganjkov. Ko bo dosežen, uporabite **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha), ki učinkuje tudi na **listne hrčice** ali **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 31.05.2022 22:11

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

