



59. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 31.05.2022 22:16 - Zaključeno



Zgodnje sorte češenj zorijo (89 po lestvici BBCH), med tem ko kasnejše začenjajo z barvanjem (81 po lestvici BBCH).

Padavine povzročajo pri zorečih **pokanje plodov** in posledičen razvoj **navadne sadne gnilobe**. Za varstvo pridelka priporočamo: **PROLECTUS** (330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; največ 1 kg/ha; karenca 1 dan), **REYONA** (1,8 l/ha; karenca 3 dni), **TELDOR SC 500** (0,5 l/ha na 1 m višine, ob porabi 500 l vode na 1 m višine krošnje, največ 1,5 l/ha; karenca 3 dni), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha; karenca 7 dni), **SIGNUM** (0,25 kg/ha na m višine krošnje ter porabi 500 l vode na ha na m višine krošnje, največ 0,75 kg/ha; za manjše uporabe; karenca 7 dni), **SWITCH 62,5** (v 0,08% koncentraciji, vendar največ 1 kg/ha; karenca 7 dni), **SERENADE ASO** (8 l/ha; karenca ni potrebna), **AMYLO – X** (1,5 do 2,5 kg/ha; karenca ni potrebna), **TAEGRO** (0,185-0,37 kg/ha; za manjše uporabe; karenca 1 dan). Slednji trije so primerni tudi za ekološko pridelavo.

Pridelovalcem svetujemo, da v nasade zgodnjih sort namestite **prehranske pasti** za spremljanje populacije **plodove vinske mušice**. Slednja lahko v času dozorevanja, zlasti v primeru deževnega vremena, povzroči večjo škodo.

Navodila za pripravo prehranskih pasti si lahko ogledate na video povezavi: <https://youtu.be/1ueLY2fXRBI>.

Za zatiranje plodove vinske mušice so registrirani naslednji insekticidi: **ASSET FIVE** (po dovoljenju za nujne primere ZVR; 0,96 l v 1500 l vode/ha; karenca 7 dni), **EXIREL** (75 ml/hl oz. največ 1 l/ha; karenca 7 dni), **IMIDAN 50 WG** (1,5 kg/ha; karenca 14 dni; na isti površini le 1 × v rastni dobi), **LASER PLUS** (0,15 L/ha; za manjše uporabe; karenca 7 dni).

Nalet in številčnost **češnjeve muhe** pri poznih sortah spremljate s pomočjo **rumenih lepljivih plošč**, katere namestite na južno stran krošnje (2 plošči / ha). Prag je presežen, ko potrdite ulov 1 muhe /ha. Za zatiranje češnjeve muhe so predvidena naslednja sredstva: **EXIREL** (največ 1 l/ha; karenca 7 dni), **IMIDAN 50 WG** (1,5 kg/ha; karenca 14 dni), **MOSPILAN 20 SG** (0,375 kg/ha; karenca 14 dni), **NATURALIS** (2 l/ha; nanos opravite vsaj 3 × zaporedoma, v razmiku 5-7 dni; karenca ni potrebna), **DECIS TRAP ČEŠNJEVAMUHA** (100 vab /ha; karenca zagotovljena s časom uporabe).

Po končanem spremljanju lepljive plošče odstranite iz nasada.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 31.05.2022 22:16

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

