

67. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 03.06.2022 13:42 - Zaključeno



Hruške in jabolane:

V večjem delu Primorske so hruške in jabolane v fazi debeljenja in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 - 73).

Škrlup

Zaradi nestanovitnega vremena z lokalnimi padavinami še vedno obstaja nevarnost za okužbe s škrlupom. V zadnjem tednu smo imeli na območju Primorske izpolnjene pogoje za blage do srednje močne okužbe s škrlupom. Na objektnih stekelcih smo zabeležili dokaj veliko število askospor. Priporočamo, da nadaljujete z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. Izbor sredstev in razmike med škropljenji prilagodite vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. V ta namen lahko uporabite pripravke na osnovi metirama in kaptana. V obdobju nestabilnega vremena dajemo prednost pripravkom na osnovi ditianona oz. pripravkom kot so: **Delan 700 WG, Alcoban** in **Delan Pro**, ki imajo daljše kurativno delovanje. V primeru večje količine padavin oz. dolgotrajne omočenosti listja, svetujemo, da takoj, ko vremenske razmere dopuščajo, opravite škropljenje s sistemskimi pripravki kot so **Score 250 EC, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC** ali **Difenzone** v odmerku 0,2 L/ha ter **Duaxo koncentrat** v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha ali **Domark 100 EC** v odmerku 0,4 L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

Sredstvo	Aktivna snov	Odmerek, konc.
Polyram DF	metiram	2,0 kg/ha
Delan pro	ditianon	0,75 kg/ha
Alcoban	ditianon	0,75 kg/ha
Delan pro	ditianon + kalijevi fosfonati	2,5 L/ha
Captan 80 WG	kaptan	2,0 kg/ha
Merpan 80 WDG	kaptan	1,88 kg/ha
Orthocide 80 WDG	kaptan	2,0 kg/ha
Scab 80 WG	kaptan	1,9 kg/ha
Scab 480 SC	kaptan	3,13 L/ha
Merplus	kaptan + kalijevi fosfonati	2,0 L/ha
Score 250 EC	difenokonazol	0,2 L/ha
Difcor 250 EC	difenokonazol	0,2 L/ha
Mavita 250 EC	difenokonazol	0,2 L/ha
Duaxo koncentrat	difenokonazol	1,1 L na višinski meter krošnje/ha (Max. 3,3 /ha)

Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko lahko uporabite naslednje pripravke: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Luna Care v odmerku 1kg/m krošnje (maks. 3,0 kg/ha), Strobry WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 2,5 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,...) priporočamo, da škroplilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Microthiol disperss, Vertipin, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito) v odmerku 3 - 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

Marmorirana smrdljivka (*Halyomorpha halys*)

V večjem delu Vipavske doline in na Tolminskem so ulovi marmorirane smrdljivke v zadnjem tednu majhni. Stenice so začele z odlaganjem

jajčec. Na nekaterih lokacijah smo že opazili pojav ličink druge stopnje (L2). Ukrepanje proti odraslim stenicom je smiselno le v primeru, da opazate zelo veliko stenic, ki se prehranjujejo na mladih plodičih. V ta namen lahko uporabite pripravek Mospilan v 0,05 % konc. (najvišji odmerek ne sme preseči 0,5 kg sredstva/ha). Pripravek deluje tudi na listne uši, zato je ukrep priporočljiv zlasti v nasadih, kjer je poleg marmorirane smrdljivke preraszmnožena tudi mokasta jablanova uš.

Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*)

Na celotnem območju Primorske so ulovi jabolčnega zavijača pod pragom škodljivosti, zato ukrepanje proti škodljivcu ni potrebno.

Hrušev ožig (*Erwinia amylovora*)

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Datum objave obvestila: 03.06.2022 13:42

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)

