



47. VARSTVO PEČKARJEV - 07.06.2022 11:46 - Zaključeno



Nevarnost primarnih okužb z **jablanovim škrlupom** se v nasadih jablan in hrušk postopoma zmanjšuje, vendar je kljub temu potrebno še naprej skrbeti za ustrezno preventivno varstvo. Posebna pozornost še posebej velja v sadovnjakih, kjer so pege škrlupa na listih že prisotne. Zaradi pogostih ploh in neviht so listi in plodiči dalj časa mokri, zato so pogoji za širjenje bolezni še naprej ugodni. Priporočamo nadaljnje izvajanje škropljenj v rednih časovnih intervalih, ki jih prilagodite količini padavin in predvidenim vremenskim razmeram. Uporabite lahko kontaktne pripravke na osnovi kaptana (**Captan 80 WG, Merpan 80 WDG Orthocide 80 WG, Merplus, Scab 80 WG oz. 480 SC**), metirama (**Polyram DF**) ali ditianona (**Delan Pro, Alcoban**). V primeru, da škropljenja ne boste uspeli opraviti pravočasno in bo ob izpolnjenih pogojih za okužbe drevje dalj časa nezavarovano, svetujemo škropljenje s sistemskimi pripravki kot so **Difcor 250 EC, Difenzone, Duaxo koncentrat, Domark 100 EC, Mavita 250 EC, Score 250 EC** ali **Revviona**, ki jim dodajte enega od kontaktnih fungicidov.

V primeru pojava neurij s točo dajte pri izbiri pripravkov prednost fungicidom s kaptanom kot so Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG idr.

Za zatiranje **jablanove pepelovke** sicer uporabite pripravke na osnovi **močljivega žvepla**. Kjer imate več težav z obvladovanjem omenjene bolezni, pa svetujemo uporabo pripravkov s sistemskim delovanjem kot so **Luna experience, Stroby WG, Zato, Zato plus, Tercel, Topas 100 EC, Topaze, Sercadis** ali **Sercadis plus** (slednja dva delujeta tudi proti jablanovemu škrlupu).

Še naprej je potrebno spremljati tudi ulove metuljev **jabolčnega zavijača** na feromonske vabe. V primeru preseganja praga škodljivosti (5-7 metuljev/teden) je priporočljivo opraviti škropljenje z insekticidi kot so: **Imidan 50 WG, Delegate, Laser plus** ali **Mospilan 20 SG** (v primeru sočasnega zatiranja listnih uši). Kjer naleta metuljev ne spremljate s feromonskimi vabami, je ponoven nanos insekticida priporočljivo opraviti po 14 dneh od prejšnjega škropljenja.

V ekoloških nasadih za varstvo pred škrlupom in pepelovko opravite škropljenje z žvepleno apneno brozgo (pripravek **Curatio**). Za zatiranje gosenic jabolčnega zavijača lahko uporabite pripravek **Madex max, Carpovirusine** ali **Laser plus**. Slednji poleg jabolčnega zavijača dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. Za zatiranje drugih vrst škodljivih gosenic lahko uporabite tudi pripravke kot so **Agree, Lepinox plus** ali **Delfin WG**.

Insekticidi so nevarni za čebele, zato jih uporabite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Pri izbiri FFS upoštevajte pravila antirezistentne strategije in bodite pozorni na največje dovoljeno število rab posameznih pripravkov.

Datum objave obvestila: 07.06.2022 11:46

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

[Seznam registriranih FFS](#)

