

57. ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - PRENAŠALCA ZLATE TRSNE RUMENICE - 20.06.2022 21:50 - Zaključeno



Zlata trсна rumenica je neozdravljiva bolezen trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma *Grapevine flavescence dorée* (FD). Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca **ameriškega škržatka**. Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe ter v okuženih območjih in pravočasno zatiranje njenega prenašalca.

Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno:

- v **matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih povsod po Sloveniji** ter
- v **vinogradih za pridelavo grozdja na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice**, ki zajema vse tri vinorodne dežele.

Za učinkovito zatiranje ameriškega škržatka je pomembno, da z zatiranjem pričnemo pravočasno, preden se v vinogradih pojavijo odrasli škržatki in ko je trta povsem odcvetela. Glede na podatke o spremljanju razvoja ameriškega škržatka in fenološkega razvoja vinske trte bo optimalni čas za uporabo insekticidov v roku naslednjih 10 dni oz. do konca meseca junija.

UPORABA INSEKTICIDOV

Pri prvem tretiranju uporabimo pripravke **Mospilan 20 SG** ali **Sivanto prime** ali **Movento SC 100**. Pripravki imajo sistemski - rezidualni način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka. Registrirana so sicer tudi nekatera druga sredstva (Preglednica), ki pa imajo kontakten način delovanja in so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden). V ekološki pridelavi sta dovoljena pripravka na podlagi a.s. piretrin, s katerima je priporočljivo opraviti 3 tretiranja, ki jih opravimo v tedenskih časovnih intervalih.

Preglednica: Fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev uporabe na dan 23. 5. 2022

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek/ha	Število dovoljenih tretiranj na rastno dobo
Mospilan 20 SG¹	acetamiprid	0,375 kg/ha	eno
Sivanto prime	flupiradifuron	0,5 l/ha	eno
Movento SC 100	spirotriamat	0,7 l/ha	dve
Decis 2,5 EC	deltametrin	0,5 l/ha	eno ² dve ³
Flora verde⁴	piretrin	1,6 l/ha	tri
Biotip floral⁴	piretrin	1,6 l/ha	tri

¹ sredstvo ima v letu 2022 dovoljenje za nujne primere za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih

² število dovoljenih tretiranj v vinogradih za pridelavo grozdja in matičnih vinogradih

³ število dovoljenih tretiranj v matičnjakih in trsnicah

⁴ sredstvo je dovoljeno za uporabo v ekološki pridelavi

SPREMLJANJE ULOVA AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Za poznavanja stanja v vinogradih za pridelavo grozdja je priporočljivo, da vinogradniki sami spremljajo ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami na način, da:

- izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večje površine vinograda število plošč ustrezno povečamo,
- plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne,
- plošče pregledujemo vsakih 7 do 10 dni vse do sredine septembra, ko so škržatki še prisotni v vinogradih,

- ulove redno beležimo.

Fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Vsa sredstva, ki so dovoljena za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Zato je pomembno, da se prvo zatiranje opravi takrat, ko je trta že povsem zaključila cvetenje. Pred uporabo insekticida je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu oziroma na drug način preprečiti, da bi jo FFS doseglo.

Datum objave obvestila: 20.06.2022 21:50

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

[Seznam registriranih FFS](#)

