



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Vinska trta
/ 74. SPREMLJANJE ULOVA AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

74. SPREMLJANJE ULOVA AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 27.06.2022 10:38 - Zaključeno



Ulov odraslih osebkov ameriškega škržatka spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami (RLP).

V vinogradih, kjer spremljamo razvojne stadije ameriškega škržatka, prevladujejo nimfe L₃ in povečuje se delež nimf L₄ razvojnega stadija. 27. junija našli tudi prve nimfe L₅ razvojnega stadija. Zato je čas, da izobesite rumene lepljive plošče.

V vinogradih za pridelavo grozdja spremljanje ni obvezno, je pa **priporočljivo zlasti v razmejenem območju zlate trsne rumenice**, saj le tako ugotovi stanje populacije in oceni, če je bilo prvo zatiranje ameriškega škržatka uspešno opravljeno ter ali bo potrebno opraviti tudi drugo škropljenje. Drugo škropljenje se opravi, če se ulovijo 4 škržatki ali več na ploščo na teden.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami **obvezno**, prav tako sta obvezni najmanj dve škropljenji. Če se po drugem škropljenju na rumeno lepljivo ploščo ulovi vsaj en škržatek, je potrebno opraviti še tretje škropljenje.

V **sredino** vinograda, matični vinograd, trsnico ali matičnjak **izobesimo najmanj 3 RLP**. Če je površina večja od 2 ha, število plošč ustrezno povečamo, kot je navedeno v preglednici spodaj.

Plošče izobesimo **v senčni del trte** na žico ali trto, ker se škržatki najraje zadržujejo v senci. V trsnici izobesimo plošče na količke, ki jih postavimo na grebenih.

RLP pregledujemo 1 x tedensko in jih menjamo na 14 dni. Ulov redno beležimo.

V vinogradih za pridelavo grozdja spremljamo ulov do konca avgusta, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa do sredine septembra.

Kdor ameriškega škržatka ne pozna, se lahko obrne na Javno službo zdravstvenega varstva rastlin (na območji Celjske in Koroške regije - Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu).

Preglednica: število rumenih lepljivih plošč glede na površino vinograda za pridelavo grozdja, matičnega vinograda, matičnjaka ali trsnice.

Površina (ha)	Število rumenih lepljivih plošč
do 2	3
nad 2 do 5	6
nad 5	9

Datum objave obvestila: 27.06.2022 10:38

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

