

76. Obvestilo o varstvu hmelja - 01.07.2022 13:56 - Zaključeno



Hmeljeva peronospora (M. Rak Cizej, F. Poličnik, S. Radišek)

V zadnjem tednu, na večini spremljanih lokacijah, z izjemo Radelj ob Dravi in Tabora, spore hmeljeve peronospore niso presegle kritičnega praga 10 spor v 4 zaporednih dneh, ki velja v fazi cvetenja in oblikovanja storžkov. V tej razvojni fazi je hmelj najbolj občutljiv za okužbo. Kljub temu, da na večini lokacij niso izpolnjeni pogoji za sekundarno okužbo s hmeljevo peronosporo, vam svetujemo uporabo fungicidov 1. v cvet, pri zgodnjih sortah pa že aplikacija v storžke.

V tem času vam priporočamo uporabo fungicidov na osnovi a.s. azoksistrobin (Mirador 250 SC ali Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC) v odmerku 1,6 l/ha, lahko pa uporabite enega izmed bakrovih pripravkov in sicer Badge WG (7,14 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (5,5 kg/ha). V ekološki pridelavi je poleg bakrovih pripravkov dovoljena uporaba fungicida Polyversum (*Pythium oligandrum*) v odmerku 0,25 kg/ha. Pri uporabi fungicidov morate upoštevati varnostne pasove oziroma odmike od voda 1. in 2. reda, ki pri pripravkih Mirador, Ortiva in Zaftra AZT 250 SC, je odmik 20 m, pri pripravku Cuprablau 30 m in pri pripravku Badge WG 40 m.

Datum objave obvestila: 01.07.2022 13:56

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Rak Cizej Magda

Pripravila: **Magda Rak Cizej**

[Seznam registriranih FFS](#)

