



88. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 12.07.2022 14:36 - Zaključeno



Oljčna muha

Trenutne in napovedane **vremenske razmere niso ugodne** za rastline, kakor tudi ne za pojav in povzročanje poškodb najpomembnejše škodljivke oljk. Ta se sicer v manjšem številu pojavlja v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk. Pri pregledu plodov poškodb zaradi napada oljčne muhe še nismo opazili.

Oljkarje obveščamo, da je še vedno čas za **ukrepanje z odvrtačnimi sredstvi in namestitve vab za množičen ulov**. Navedena ukrepa sta zelo učinkovita pri manjši populaciji oljčne muhe. Trenutno drugi ukrepi proti škodljivki niso potrebni.

Glede na napovedan nov vročinski val priporočamo ukrepanje **z odvrtači** na osnovi talka oz. kaolina kot so npr. **Invelop White Protect ali Surround WP**. Rastopine omenjenih pripravkov rastlino ščitijo pred abiotičnim stresom kot so visoke temperature in omejijo napad škodljivih žuželk.

Priporočamo tudi namestitev **vab za množičen ulov** oljčne muhe, čigar cilj je privabljanje oziroma zatiranje škodljivca z večjim številom vab. Le te so lahko različnih oblik in delujejo vizualno (rumena barva), prehransko (razne amonijske soli, hidrolizirani proteini...) ter s pomočjo spolnih feromonov. Izdelamo jih lahko tudi sami.

V letošnjem letu sta za zatiranje oljčne muhe registrirani zastrupljeni vabi **FLYPACK DACUS TRAP** in **ECO_TRAP**, ki se lahko uporabljata tudi pri ekološki pridelavi oljk. Prva je v obliki lovne posode druga kot vrečka. Obe vsebujeta aktivno snov deltametrin, prehransko privabilo amonijev bikarbonat in spolni feromon samic.

Vaba **ECO-TRAP** je namenjena za preventivno uporabo v oljčnih nasadih v območjih s srednje intenzivnim pritiskom populacije oljčne muhe (*Bactrocera oleae*), kjer zmanjšuje delež poškodovanih plodov v osnovnem odmerku 100 vab/ha (1 vaba/100 m²). Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.

FLYPACK DACUS TRAP - insekticidna vaba je zaprt sistem. Sestavljena je iz dvodelnega deljivega ohišja (posode) iz umetne snovi, feromonskega in prehranskega privabila ter obešala za pripenjanje v krošnjo dreves na zunanosti pokrova. Spodnji del ohišja je rumeno oranžne barve, ki tudi z barvo privablja oljčne muhe, in ima stranske vstopne odprtine za odrasle osebkke ciljnega organizma. Pokrov ohišja je prozoren, na njegovo notranjo stran je nanesen prozoren insekticidni premaz na osnovi deltametrina. V nasad oljk se enakomerno porazdeli od 50 do največ 100 vab na hektar, odvisno od pričakovane stopnje napada oljčne muhe.

Posamezno vabo lahko uporabljamo tudi za spremljanje pojava oljčne muhe.

Pred uporabo obvezno preberite in dosledno upoštevajte navodila za uporabo.

Oljkarje obveščamo, da bo v primeru številnejšega pojava oljčne muhe, napad le te zaradi večjih in razvitejših plodov, **večji v namakanih oljčnikih**. Priporočamo redno spremljanje škodljivke s pomočjo feromonskih vab ali rumenih lepljivih plošč,

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 12.07.2022 14:36

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

