



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Plodovke

/ 85. OBVESTILO O VARSTVU KUMAR, BUČK IN BUČNIC PRED PEPELOVKAMI

85. OBVESTILO O VARSTVU KUMAR, BUČK IN BUČNIC PRED PEPELOVKAMI - 13.07.2022 11:30 - Zaključeno



1. VARSTVO KUMAR, BUČK IN BUČ PRED PEPELOVKAMI

Pri opazovanju nasadov kumar, bučk in buč smo opazili pojave pepelovke bučnic v zavarovanih prostorih in tudi na prostem. Bela, kasneje sivkasta prevleka na zgornji strani listov lahko preraste celotno listno površino in povzroči predčasno sušenje ter propadanje listov. Za preprečevanje okužb in zatiranje pepelovk priporočamo uporabo fungicidov:

AQ-10 (na prostem; bučnice z užitno in neužitno lupino vključno z oljnimi bučami; 35 g/ha; K = 1 dan, največ 2-krat v eni rastni sezoni), **Biotip sulfo 800 SC** (manjša uporaba, na prostem in v zaščiteneih prostorih; 5-7,5 L/ha; bučke, buče, oljne buče, kumara, lubenica, K = 3 dni, največ 6-krat v eni rastni dobi), **Collis** (samo v zaščiteneih prostorih; 0,5 L/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino; K = 3 dni, največ 3-krat v enem rastnem ciklusu), **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol disperss**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG** (vsi na prostem; kumare, bučke, buče, dinje lubenice; 5-7,5 kg/ha, K = 3 dni, največ 6-krat v eni rastni dobi), **Duaxo koncentrat** (na prostem; 1 % oz. 10 mL/1L vode; bučke, navadne kumare; K = 3 dni, največ 3-krat v eni rastni dobi), **Duaxo sprej** (na prostem; gotovi pripravek; bučke, navadne kumare; K = 3 dni, največ 3-krat v eni rastni dobi), **Fytosave** (v zaščiteneih prostorih; kumare, bučke, buče, kumarice, dinje, **manjša uporaba**; na prostem; bučke z užitno in neužitno lupino; 2 L/ha; K – ni potrebna, največ 5-krat v eni rastni sezoni), **Microthiol SC** (**manjša uporaba**, na prostem; kumare za vlaganje, bučke, buče, dinje lubenice; 5-7,5 kg/ha, K = 3 dni, največ 1-krat v eni rastni dobi), **Karbicure** (na prostem in v zaščiteneih prostorih; kumare, kumarice za vlaganje, bučke, dinje, lubenice, buče; 3 kg/ha, K = 1 dan, največ 8-krat v eni rastni dobi), **Mirador 250 SC**, **Ortiva**, **Zafra AZT 250 SC** (vsi 1,0 L/ha, navadna kumara, kumare za vlaganje, bučke, bučnice z neužitno lupino (brez oljnih buč), K = 3 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni (bučnice z neužitno lupino, navadna kumara); največ 3-krat v eni rastni sezoni (bučka, kumare za vlaganje), **Mavita 250 EC**, **Score 250 EC** (oba na prostem; bučnice z užitno in neužitno lupino; 0,5 L/ha; K = 3 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni), **Polyversum** in **Univerzalni fungicid** (**manjša uporaba**, na prostem; 0,1-0,2 kg/ha, kumare, K = 1 dan, največ 1-krat v eni rastni sezoni), **Sercadis plus** (na prostem in v zaščiteneih prostorih; 0,6 L/ha, bučnice z užitno lupino-kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi, največ 3-krat v eni rastni sezoni, K = 3 dni), **Serenade ASO** (**manjša uporaba**, na prostem in v zaščiteneih prostorih; kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje, lubenice; 8L/ha, K ni potrebna, največ 6-krat v eni rastni dobi), **Sonata** (v zaščiteneih prostorih; kumare, buče, bučke, dinje, lubenice, 5-10 L/ha, K ni potrebna, največ 6-krat v eni rastni sezoni), **Sythane 20 EW** - zaloge v uporabi do 30.11.2022 (na prostem in v zaščiteneih prostorih; 0,15 L/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče- razen oljnih buč; K = 3 dni; za buče K = 7 dni, največ 3-krat v eni rastni dobi v zaščiteneih prostorih oziroma največ 4-krat v eni rastni dobi pri uporabi na prostem), **Taegro** (na prostem (**manjša uporaba**) in v zaščiteneih prostorih; kumare, kumarice za vlaganje, bučke, melone, lubenice, druge bučnice; 0,185 - 0,37 kg/ha, K = 1 dan, na prostem največ 10-krat v eni rastni dobi, v zaščiteneih prostorih največ 12-krat v eni rastni dobi), **Topas 100 EC** in **Topaze** (samo v zaščiteneih prostorih; 0,5 L/ha; buče, bučke, dinje, navadne kumare, lubenice; K = 3 dni, dinje in lubenice največ 3-krat; kumare, bučke in buče največ 4-krat v eni rastni dobi), **Vertipin** (na prostem in v zaščiteneih prostorih; 6 L/ha; kumare, bučke, buče, dinje, lubenice; K = 3 dni, največ 6-krat v eni rastni sezoni), **Vitisan** (**manjša uporaba**, na prostem in v zaščiteneih prostorih; kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje, lubenice; 1,5-3,0 kg/ha; K = 1 dan, največ 6-krat v eni rastni dobi).

Za dovoljene manjše uporabe FFS učinkovitost in fitotoksičnost ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva! Dosledno upoštevajte karencne dobe in vsa ostala opozorila navedena v navodilih za uporabo!

Datum objave obvestila: 13.07.2022 11:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

