



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Vinska trta
/ 87. SPREMLJANJE IN DRUGO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

87. SPREMLJANJE IN DRUGO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 13.07.2022 12:57 - Zaključeno



V razmejenem območju oz. varovalnem pasu občin : **Vojnik, Zreče, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli**, kjer deluje Javna služba zdravstvenega varstva Celjske in Koroške regije, je v vinogradih za pridelavo grozdja v rastni dobi **obvezno opraviti najmanj eno tretiranje**.

V tem tednu v vinogradih na opazovanih lokacija, kjer je bilo opravljeno prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku v napovedanem roku (med 20. in 30. junijem), na rumenih lepljivih ploščah beležimo prve odrasle osebkke ameriškega škržatka (1 do 2 odrasla osebka na vabo /teden). Svetujemo, da v vinogradih redno spremljajte ulov ameriškega škržatka. **Če se ulovijo 4 škržatki ali več na ploščo na teden, opravite med 15. in 25. julijem drugo tretiranje.**

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je povsod po Sloveniji obvezno drugo tretiranje. Če je po drugem tretiranju na rumeno lepljivo ploščo ulovljen **vsaj en škržatek**, je potrebno opraviti še tretje tretiranje.

Za drugo škropljenje priporočamo uporabo insekticidov kot so: **Sivanto prime** (0,5 L/ha) - 1 krat letno, **Movento SC 100** (0,7 L/ha) - 2 krat letno ali **Decis 2,5 EC** (0,5 L/ha) – 1 krat letno vinogradi za pridelavo grozdja in matični vinogradi; 2 krat letno matičnjaki in trsnice. Prednost dajte pripravku Sivanto prime, če ga niste uporabili pri prvem tretiranju ali Movento SC 100. Pripravek Decis 2,5 EC spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

V ekološki pridelavi razmejenega območja pa so obvezna najmanj tri tretiranja. V ekološki pridelavi imata dovoljenje za uporabo pripravka na podlagi a.s. piretrin **Flora verde** (1,6 L/ha) in **Biotip floral** (1,6 L/ha).

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so **nevarna za čebele**. Škropljenje opravite **v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah** (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati **v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi** ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18 in 56/22).

Aplikacija FFS

Za doseganje večje učinkovitosti delovanja insekticidov priporočamo njihovo uporabo v večernih oziroma nočnih urah. Rastline v času aplikacije ne smejo biti v stresu (npr. vročinski stres), sicer se učinkovitost sredstva lahko zmanjša. **Insekticidov na osnovi a.s. piretrin** (Flora verde in Biotip floral) se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Ob njihovi uporabi rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se običajno nahaja ameriški škržatek.

Da dosežemo **dobro omočenje rastlin** in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l vode/ha).

Za pripravek **Movento SC 100** priporočamo samostojno uporabo. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

Podrobnejše informacije o zatiranju ameriškega škržatka in obvladovanju zlate trsne rumenice v letu 2022 so vam na voljo na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Datum objave obvestila: 13.07.2022 12:57

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS

