



75. VARSTVO PEČKARJEV - 18.07.2022 14:55 - Zaključeno



VARSTVO PEČKARJEV

Za preprečevanje okužb in širjenja **glivičnih bolezni** v nasadih pečkatih vrst sadja svetujemo redna, preventivna škropljenja, ki jih izvajate v približno dvotedenskih razmikih. V kolikor so na listih prisotne pege škrupa poskrbite, da bodo listi in plodovi stalno zaščiteni. Pogostost škropljenj prilagodite padavinam in vremenski napovedi. Za varstvo jablan je v tem času primerna uporaba kontaktnih pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan kot so **Merpan 80 WDG**, **Captan 80 WG**, **Merplus**, **Ortocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 S**. Naštete pripravke uporabite tudi v primeru neurij s točo saj preprečujejo gnitje poškodovanih plodov. V kolikor imate še na zalogi, je pri zgodaj zorečih sortah, smiselno uporabiti pripravke s trifloksistobinom kot sta **Zato 50 WG** in **Zato plus**, ki preprečujejo razvoj poznega škrupa in drugih skladiščnih bolezni na plodovih.

V ekoloških nasadih lahko proti listnimi pegavostim in škrlupu uporabite tudi žvepleno apneno brozgo **Curatio** ter pripravek **Vitisan**.

Glede na številčnost ulovov **jabolčnega zavijača** sklepamo, da smo v polnem naletu druge generacije škodljivca. Škropljenje opravite v primeru, da ulovi metuljev na feromonske vabe presegajo prag škodljivosti, ki za drugi rod škodljivca znaša 5-7 metuljev/ ploščo/ teden in je od zadnjega škropljenja minilo vsaj 14 dni. Sedaj je primerna uporaba enega izmed insekticidov s krajšo karenčno dobo kot so **Affirm**, **Affirm opt**, **Delegate 250 WG** ali **Laser plus**. V nasadih kjer imate težav z ušmi, lahko še vedno uporabite pripravek **Mospilan 20 SG**. Ekološki pridelovalci lahko uporabite pripravke: **Madex max**, **Carpovirusine** in **Laser plus**.

V obdobju suhega in toplega vremena prihaja v nasadih do prerazmnožitev **fitofagnih pršic**, zlasti **navadne pršice** in **rdeče sadne pršice**. Ob preseganju pragov škodljivosti lahko proti njim ukrepate z uporabo registriranih akaricidov kot so **Vertimec PRO**, **Shirudo**, **Milbeknock**, **Kanemite SC**.

Pri varstvu zgodnjih sort jabolk bodite pozorni na karenčne dobe pripravkov! Pred škropljenjem z insekticidi odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih!

Datum objave obvestila: 18.07.2022 14:55

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

