

78. VARSTVO VINSKE TRTE - 25.07.2022 14:17 - Zaključeno



Vinska trta je v zaključni fazi razvoja grozdličev (BBCH-79-81), jagode pri rdečih sortah postopoma že dobivajo sortno značilno barvo. Nevarnost za okužbe s peronosporo in oidijem še ni minila, ob napovedani spremembi vremena s pogostejšimi lokalnimi plohami in nevihtami bodo pogoji za okužbe spet bolj ugodni. V vinogradih bo potrebno obnoviti fungicidno oblogo na listih in grozdih, na območjih kjer so bolezenska znamenja že prisotna je potrebno več pozornosti nameniti preprečevanju širjenja okužb. Prirast zelenih delov vinske trte se postopoma umirja, zato lahko za varstvo pred **peronosporo** pri naslednjem škropljenju uporabite katerega od dotikalnih fungicidov na osnovi folpeta kot so **Follow 80 WG**, **Folpan 80 WDG** ali **Solofol**. Uporabite lahko tudi pripravek **Universalis**, ki deluje tudi proti oidiju. Za zaključna škropljenja je ustrezna zlasti izbira bakrovih fungicidov kot so **Badge WG**, **Cuprablau Z 35 WG** oz. **WP**, **Cuproxat**, **Kocide 2000**, **Nordox 75 WG** ali kombiniranega pripravka z bakrom **Pergado C** (do začetka zorenja).

Dokler jagode v grozdih ne pridejo v fazo zorenja za varstvo pred **oidijem** svetujemo dodajanje žvepla škropilni brozgi. Uporabite lahko enega izmed pripravkov kot so: **Azumo WG**, **Biotip Sulfo 800 SČ**, **Cosan**, **Cosavet DF**, **Cosinus**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss**, **Močljivo žveplo Karsia DF**, **Pepelin**, **Pol-Sulphur 800 SC** oz. **80 WG**, **Symbiotica fito – tekoče žveplo** oz. **granulirano žveplo**, **Thiovit Jet**, **Vertipin** ali **Vindex 80 WG**. Kjer so okužbe na grozdih prisotne v večji meri lahko namesto žvepla uporabite kontaktni pripravek **Karathane gold** ali **Kusabi**. V ekološki pridelavi za varstvo pred oidijem poleg žvepla lahko uporabite tudi pripravke na osnovi kalijevega hidrogenkarbonata kot sta **Karbicare** ali **Vitisan**. Na voljo so tudi pripravki na osnovi mikroorganizmov: **AQ 10**, **Sonata** in **Taegro**.

Pri uporabi kontaktnih pripravkov bodi pozorni na časovne razmike med posameznimi škropljenji, ki jih prilagodite zdravstvenemu stanju vinogradov in količini padavin. V primeru, da pade več kot 25 mm dežja, se predvideva, da je fungicidna obloga na listih sprana in jo je potrebno obnoviti.

Pri izbiri sredstev upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab, upoštevajte veljavne registracije in karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 25.07.2022 14:17

Obvestilo prognošičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

[Seznam registriranih FFS](#)

