

**79. VARSTVO BUČEVK PRED PEPELOVKAMI - 26.07.2022 13:37 - Zaključeno**

Na bučkah, bučah, kumarah, lubenicah in dinjah bodite pozorni na pojav pepelovke bučnic. V primeru pojava belo sivih prevlek na zgornji strani listov priporočamo uporabo katerega izmed registriranih fungicidov.

Na kumarah, bučkah, bučah, lubenicah in dinjah na prostem in v zavarovanih prostorih lahko uporabite sredstva na osnovi azoksistrobina (**Mirador 250 SC, Ortiva, Zafra AZT 250 SC**), **Sercadis plus, Systane 20 EW** (samo na kumarah, bučah in bučkah), v zavarovanih prostorih tudi **Collis** (samo na kumarah in bučkah), **Topas 100 EC, Topaze**; samo na prostem pa tudi **Mavita 250 EC, Score 250 EC, Duaxo koncentrat** ali **Duaxo sprej**.

V ekološki pridelavi lahko uporabite biološke pripravke **AQ-10, Sonata** (v zavarovanih prostorih), **Taegro, Serenade Aso** (registracija za manjše uporabe), sredstvo na osnovi kalijevega hidrogen karbonata **Karbicure** ali **Vitisan** (registracija za manjše uporabe), fungicid **Fytosave** na osnovi oligosaharidov, ki sprožijo imunski odziv pri rastlini ali katerega od žveplovih pripravkov (**Cosan, Biotip Sulfo 800 SC, Kumulus DF, Microthiol SC, Microthiol special, Microthiol disperss, Pepelin, Thiovit Jet, Vertipin ali Vindex 80 WG**). Žveplovi pripravki imajo stransko delovanje na pršice. Z njimi se tretira, ko so temperature zraka med 15 in 25 °C, saj lahko pri visokih temperaturah povzročajo ožige.

Pred rabo fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 26.07.2022 13:37

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: MAROLT Neja

Pripravila: **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

