

81. VARSTVO PEČKARJEV - 03.08.2022 09:40 - Zaključeno



V nasadih zgodnjih sort jablan, se sezona rednih škropljenj proti povzročiteljem bolezni in škodljivcem postopoma končuje. Pri zaključnih škropljenjih lahko za varstvo pred **poznim škrlupom in drugimi skladiščnimi boleznimi** uporabite naslednje pripravke: **Bellis** (7 dni karence), **Geoxe** (3 dni), **Pomax** (5 dni), **Luna Experience** (14 dni), **Switch** (3 dni). Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi mikroorganizmov **Amylo-X** (brez karence) ali pripravka na osnovi kalijevega hidrogenkarbonata kot sta **Karbicare** (1 dan) in **Vitisan** (1 dan).

Pri sortah, ki dozorevajo pozneje (Idared, Braeburn, Fuji ipd.), je v avgustu še vedno priporočljivo opraviti škropljenje s pripravki na osnovi kaptana kot so **Zato plus** (35 dni karence), **Zato 50 WG** (21 dni), **Merpan 80 WDC** (28 dni), **Orthocide 80 WG** (28 dni), **Scab 80 WG /480 SC** (21 dni) ali **Luna Care** (28 dni). Uporaba slednje ni dovoljena na sorti zlati delišes in njegovih varietetah.

V nasadih, kjer ni prisotnih peg škrlupa še naprej obnavljajte fungicidno oblogo v presledkih 10 do 14 dni. Natančnejše termine škropljenj prilagodite količini padavin in napovedanim vremenskim razmeram.

Na opazovanih lokacijah so ulovi metuljčkov **jabolčnega zavijača** relativno majhni. Sadjarjem svetujemo, da ukrepanje prilagodite stanju v nasadu. Prag škodljivosti je presežen v primeru, da se na eno feromonsko vabo ujame 5 do 7 metuljev/teden ali, da je ob pregledu črvivih več kot 1 % plodičev (potrebno je pregledati vsa 1000 plodičev/sorto). V primeru preseganja pragov škodljivosti svetujemo uporabo pripravkov s krajšo karenčno dobo kot so **Affirm**, **Affirm opti**, **Delegate 250 WG** ali **Laser plus**.

Trenutne vremenske razmere zelo ustrezajo razvoju različnih vrst **fitofagnih pršic**. V določenih sadovnjakih opažamo pojav simptomov (poškodb) na listih, ki so posledica prerazmnožitve nekaterih vrst pršic, zlasti navadne in rdeče sadne pršice ter po nekod tudi rjaste pršice. Ukrepite lahko z enim izmed registriranih akaricidov kot so **Kanemite SC**, **Vertimec PRO**, **Shirudo** ali **Milbeknock**.

Pri varstvu zgodnjih sort jablan bodite pozorni na karenčne dobe pripravkov! Pred škropljenjem z insekticidi odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih!

Datum objave obvestila: 03.08.2022 09:40

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

