

98. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 05.08.2022 11:08 - Zaključeno



Hruške in jabolane:

Na Primorskem so jabolane in hruške v fazi debeljenja plodov (BBCH 75-79).

Jabolčni zavijač

V zadnjem tednu smo zabeležili velik ulov jabolčnega zavijača na območju Spodnje Vipavske doline. Ukrepanje proti škodljivcu je potrebno samo na lokacijah, kjer je presežen prag škodljivosti in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni. Za ta namen lahko uporabite pripravke **Affirm** v odmerku **1 kg/ha na 1 m višine krošnje** (max. odmerek **4,0 kg/ha**), **Affirm Opti** v odmerku **2,0 kg/ha**, **Delegate 250 WG** v odmerku **0,3 kg/ha** ali **Laser plus** v odmerku **0,3 L/ha**.

Škrlup in skladiščne bolezni sadja

Za zaključna škropljena proti škrlupu dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro delovanje na skladišni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Za ta namen lahko uporabite naslednje pripravke:

JABLANE	HRUŠKE	Odmerek / konc.	Karenca
Sredstvo			
Captan 80 WG	Captan 80 WG	2,0 kg/ha	28 dni
Merpan 80 WDG	Merpan 80 WDG	1,88 kg/ha	28 dni
Scab 80 WG	Scab 80 WG	1,9 kg/ha	28 dni
Scab 480 SC	Scab 480 SC	3,13 L/ha	21 dni
Orthocide 80 WG	Orthocide 80 WG	2 kg/ha	21 dni
Zato 50 WG	-	0,1- 0,15 kg/ha	21 dni
Zato plus	-	max. 1,9 kg/ha	35 dni
Luna experience	Luna experience	0,75 L/ha	14 dni
Bellis	Bellis	0,8 kg/ha	7 dni
Scala	Scala	1,5 L/ha	7 dni
Pomax	Pomax	1,6 L/ha	5 dni
Geoxe	Geoxe	0,45 kg/ha	3 dni
Switch 62,5 WG	Switch 62,5 WG	1,0 kg/ha	3 dni
Vitisan	-	2,5 kg/m višine krošnje	1 dan

Marmorirana smrdljivka (*Halyomorpha halys*)

Z zaključkom sezone obiranja breskev je povezana selitev marmorirane smrdljivke v nasade pečkarjev, kar v zadnjem tednu dokazujejo povečani ulovi odraslih stenic na feromonskih vabah. Visoke temperature zaenkrat zavirajo odlaganje jajčec, zato so ličinke nižjih razvojnih stopenj v nasadih maloštevilčne. Svetujemo, da redno pregledujete nasade ter z vizualnimi pregledi in otresanjem rastlin spremljate marmorirano smrdljivko. Pozorni bodite zlasti na njen pojav in morebitne poškodbe plodov v notranjih vrstah v nasadu. Ukrepanje proti škodljivki pa svetujemo le v primeru ugotovljenega velikega števila odraslih stenic ali ličink nižjih razvojnih stopenj (L2-L3) ter prisotnosti poškodb na plodovih.

Fitofarmacevtsko sredstvo	Odmerek / konc.	Kultura	OPOMBE
------------------------------	--------------------	---------	--------

Mospilan 20 SG	0,05 % Max. 0,5 kg/ha	sliva, jablana, hruška, breskev, nektarina, marelica	Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno
Karate Zeon 5 CS	0,018 %	hruška	Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno
Decis 2,5 EC*	0,5 L/ha	sliva, jablana, hruška, breskev, marelica, oreh, leska	Na istem zemljišču dovoljeni največ 2 tretiranja letno Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Aset Five	0,064 %	pečkate in koščičaste sadne vrste, jagodičevje, agrumi, leska, aktinidija, kaki, smokva	Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 15.06.2022 do 14.10.2022 Na istem zemljišču dovoljena največ 3 tretiranja letno Sredstvo se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi sadja

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 05.08.2022 11:08

Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)

