



## 107. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 02.11.2022 11:08 - Zaključeno



Pridelovalcem jabolk in hrušk svetujemo, da z zaključevanjem ravnega obdobja v nasadih ob odpadanju listja poskrbite za preventivno varstvo ran, ki nastanejo zaradi defoliacije ali drugih poškodb na skorji.

Za zmanjšanje možnosti okužb lesa z **glivičnimi** (*jablanov rak*, *gniloba koreninskega vratu*,...) in **bakterijskimi obolenji** (*hrušev ožig*) svetujemo ob začetku odpadanja listja nanos bakrovih pripravkov. Njihova uporaba bo znižala tudi infekcijski potencial **jablanovega** in **hruševega škr lupu**. Izbirate lahko med pripravki: **CUPRABLAU Z 35 WG** (za zatiranje *jablanovega škr lupu* 3 kg/ha, oz. *gnilobe koreninskega vratu*: tretiranje posamičnih okuženih dreves v odmerku 15 – 35 g na 100 l vode, ob porabi 0,1 do 0,15 l vode na drevo), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha; proti *jablanovemu škr lupu*), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2 kg/ha; proti *jablanovemu škr lupu*) ali **KOCIDE 2000** (2 kg/ha; proti *jablanovemu škr lupu*), **BADGE WG** (2,9 kg/ha; proti *hruševemu ožigu*), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha; le proti *jablanovemu raku*).

Z dodajanjem UREE (20 kg/ha; 2 % raztopina) boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri nizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.**

Datum objave obvestila: 02.11.2022 11:08

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

