



### 123. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 08.11.2022 11:05 - Zaključeno



Koščičaste sadne vrste so zaključile fazo intenzivnega odpadanja listja. V nasadih breskev in nektarin opravite jesensko škropljenje proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev**. Proti listni luknjičavosti koščičarjev poškropite tudi **marelice, češnje, višnje, slive in češplje**.

Za omejevanje naštetih bolezni kakor tudi ostalih listnih pegavostih (**češnjeva listna pegavost, češpljeva rdeča listna pegavost**) uporabite enega od pripravkov na osnovi bakra kot so: **Badge WG** (3,5 kg/ha breskev, nektarina, marelica, češnja, višnja, sliva), **Cuprablau Z 35 WP** (3 kg/ha – breskev, nektarina), **Cuprablau Z 35 WG** (1,6 – 2 kg/ha – breskev, marelica, češnja, sliva), **Champion 50 WG** (2 – 3 kg/ha – češnja, višnja, marelica, sliva, češplja) ali **Nordox 75 WG** (2 kg/ha – breskev, nektarina). Vloga bakrovih pripravkov je razkuževalne narave, hkrati pa kažejo tudi dobro stransko delovanje na bolezni lesa kot sta ožig breskove skorje in breskov rak, katerih bolezenska znamenja prepoznamo po sušenju in smoljenju vej.

*Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo enake ali višje od 5 °C.*

Datum objave obvestila: 08.11.2022 11:05

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

