

125. VARSTVO LUPINARJEV - 08.11.2022 11:08 - Zaključeno



Ob zaključku intenzivnega odpadanja listja svetujemo proti glivičnim in bakterijskim boleznim v nasadih orehov, leske in kostanja opraviti škropljenje z enim pripravkom na osnovi bakra.

Za zatiranje **bakterijske črne listne pegavosti** na oreh in leski lahko uporabite: **Cuprablau Z 35 WG** (1,6 – 1,7 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WP** (2 kg/ha), **Cuprablau Z 50 WP** (2,4 kg/ha), **Cuproxat** (oreh: 2,6-7,9 L/ha; leska: 3,6-6,6 L/ha), **Champion 50 WG** (oreh:1-3 kg/ha, leska: 1,4-2,5 kg/ha) ali **Champ formula 2 FLO** (oreh: 1,39-4,17 L/ha; leska:

2,08 L/ha).

Za zatiranje glivičnih bolezni lesa na **orehu in leski** ter **kostanju** (listna pegavost kostanjev) uporabite pripravek: **Cuprablau Z 35 WG** (1,6-1,7 kg/ha) ali **Champ formula 2 FLO** (leska, kostanj: 2,08 L/ha; oreh: 1,39-4,17 L/ha).

V nasadih orehov kakor tudi ohišnicah že več let zapored beležimo povečan obseg pojava **orehove rjave pegavosti ali antakoze** (*Gnomonia leptostyla*).

Gliva napada predvsem liste, pa tudi plodove. Na listih so pege z rjavim robom in sivkastim micelijem na sredini. Okuženi listi se zvijajo, sušijo in pogosto predčasno odpadejo. Na plodovih so pege nekoliko vderte, med letom počrniijo in prikrijejo velik del zelene lupine. Pri zgodnji okužbi plodovi predčasno odpadejo, pri poznem pojavu pa v obliki mumij ostanejo na drevesu do pozne jeseni.

V nasadih, kjer opazite takšne simptome je smiselno poleg jesenskega škropljenje z bakrovimi pripravki tudi pograbititi ter zažgati okuženo listje in plodove.

Datum objave obvestila: 08.11.2022 11:08

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)