

1. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 07.03.2023 13:50 - Zaključeno



Brsti koščičastih sadnih vrst so v JV Sloveniji močno nabrekli in pri breskvi se bodo v prihodnjih dneh začeli razpirati. Vidne so svetlo rjave luske (51 po lestvici BBCH). Z rastjo nočnih temperatur bo razvoj v prihodnjih dneh pospešil.

Pridelovalcem svetujemo izvedbo preventivnega varstva pred **breskovo kodravostjo**. V nasadih je potrebno opraviti nanos zaščitnih sredstev še pred padavinami, ki bi predstavljale povečano nevarnost okužb. Za prvo tretiranje priporočamo **pripravke na osnovi bakra**, ki varujejo tudi pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** in **bakterijskimi okužbami**: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3,0 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2,0 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), **BADGE WG** (3,5 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha; proti breskovi kodravosti). Poleg naštetih ima od 15.03.2023 do 14.07.2023 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe tudi pripravek **CURATIO žvepleno apnena brozga** (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Poskrbite za kakoviten nanos z večjo porabo vode (priporočena količina je od 350 do 700 l/ha) in zaščitite tudi vrhove dreves. Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

V tem času pride v poštev tudi **beljenjem debel z apnenim beležem**, oz. **kaolinskimi glinami**, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje in pregrevanje debel upočasnili.

Datum objave obvestila: 07.03.2023 13:50

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

