

### 3. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 09.03.2023 07:51 - Zaključeno



Toplo vreme močno pospešuje fenološki razvoj rastlin. Na območju osrednje Slovenije so breskve in nektarine začele napenjati brste. V času brstenja koščičastih vrst sadja (breskve, nektarine, marelice) je toplo, nestanovitno vreme ugodno za razvoj nekaterih glivičnih in bakterijskih bolezni kot so breskova kodravost, listna luknjičavost koščičarjev, bakterijski rak koščičarjev... Varstvo pred temi boleznimi začnemo izvajati v času brstenja s sredstvi na osnovi bakra. Sadjarjem svetujemo naj v nasadih, ki že brstijo opravijo škropljenje. Bodite pozorni na vremenske razmere in v primeru negativnih nočnih temperatur počakajte s škropljenjem. Uporabite lahko enega izmed registriranih pripravkov kot so **Badge WG**, **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35 WP in Nordox 75 WG** (samo breskve in nektarine). V letošnjem letu je pridobilo izjemno dovoljenje za uporabo v ekološki pridelavi breskev in marelic, sredstvo **Curatio žvepleno apnena brozga**. Pripravek lahko uporabite proti listni luknjičavosti koščičarjev, pepelastim plesnim in breskovi kodravosti na breskvah, v obdobju med **15.03.2023 in 14.07.2023**.

Na posameznih, toplih mikrolokacijah kot so npr. ohišnice, lahko marelice že odpirajo posamezne cvetove. Za varstvo pred okužbami s cvetno monilijo lahko pred napovedanimi padavinami uporabite enega izmed fungicidnih sredstva kot so **Amylo-X**, **Chorus 50 WG**, **Duaxo koncentrat**, **Prestop**, **Prolectus**, **Revyona**, **Serenade aso**, **Signum**, **Switch 62,5 WG**, **Zenby**. Prvo škropljenje je potrebno opraviti, ko je odprtih 10% cvetov.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila!**

Datum objave obvestila: 09.03.2023 07:51

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

