



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Pečkarji

/ 13. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - jablana, hruška

13. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - jablana, hruška - 13.03.2023 12:38 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo C po Fleckingerju oz. BBCH 53 (odpiranje brsta).

Pregled zimskih plodišč **JABLANOVEGA ŠKRLUPA** je pokazal, da so askospore v posameznih plodiščih na listih jablan zaradi nizkih temperatur le delno dozorele. O dozorevanju askospor vas bomo sproti obveščali.

Zgodnje sorte hrušk so na ugodnih legah dosegle fenološko fazo C3 po Fleckingerju oz. BBCH 54 (stadij mišjega ušesa). V primeru vremenske napovedi z obilnimi padavinami (nad 10 L/m²) je potrebno poskropiti **HRUŠKE**, ki so v razvoju hitreje in to še **pred** napovedanimi padavinami. Priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov:

- Badge WG (2,9 kg/ha),
- Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha),
- Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha),
- Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha),
- Kocide 2000 (2 kg/ha),
- Nordox 75 WG (1,6 kg/ha).

Vsi naštetni bakrovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V vseh intenzivnih nasadih hrušk, travniških nasadih in sadnih vrtovih je priporočljiva uporaba pripravkov na osnovi bakra saj so deloma učinkoviti tudi proti **hruševemu ožigu**.

V nekaterih nasadih smo ujeli hroščke **JABLANOVEGA CVETOŽERJA**, našli smo vbode (med 25 % in 79 % nabodenih brstov), jajčec še nismo našli. Priporočamo pregled nasadov, predvsem tistih, kjer je škoda v preteklih letih že bila ugotovljena in nasadov v bližini gozdov. V teh nasadih priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste – prag škodljivosti je presežen kadar je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku).

V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti priporočamo uporabo pripravka **Asset five**, ki ima v letošnjem letu dovoljenje za nujne primere za zatiranje jablanovega cvetožerja na jablanah. Uporablja se v 0,064 % koncentraciji (0,96 L v 1500 L vode na ha) v začetku brstenja jablane (razvojna faza B – C3, oz. BBCH 51 – 54), ob prisotnosti škodljivih žuželk. Na istem zemljišču se lahko tretira **NAJVEČ** dvakrat. Tretiranje se po potrebi ponovi 7 dni po predhodnem. S sredstvom se tretira zvečer, oziroma v najhladnejših urah dneva. **Priporočeni pH škropilne brozge je od 5 do 6.** Škropilno brozgo je zato treba po potrebi zakisati z dodatkom citronske kisline (ekološka vzgoja) ali sredstva Pekacid. Sredstvo se ne meša s sredstvi alkalne pH reakcije (npr. bordojsko brozgo). Glede mešanja z drugimi sredstvi se je treba posvetovati z zastopnikom za sredstvo.

V nasadih, v katerih najdemo sesajoče žuželke, kot npr. **HRUŠEVE BOLŠICE**, priporočamo uporabo kaolinskih glin (Cutisan ali Malusan v odmerku 30 kg/ha), katerih uporaba predstavlja ukrep za znižanje stopnje napada omenjenih žuželk. Priporočamo, da se njihova uporaba v odvisnosti od padavin in trajanja odlaganja jajčec do konca brstenja večkrat ponovi. Ukrep je možno izvesti v integrirani in ekološki pridelavi.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 13.03.2023 12:38

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: Lešnik Leonida

Pripravila: **Leonida Lešnik**

Seznam registriranih FFS

