

8. VARSTVO MARELIC - 14.03.2023 21:23 - Zaključeno



Nasadi marelic cvetijo (60 – 67 po lestvici BBCH).

Ob deževnem vremenu je potrebno poskrbeti za varstvo pred **cvetno monilijo**. Tretira se dvakrat, prvič na začetku cvetenja in drugič ob odpadanju venčnih listov. Svetujemo rabo pripravkov kot so: **AMYLO-X** (1,5 do 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje), **PRESTOP** (2 kg/ha), **PROLECTUS** (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), **REYONA** (1,8 l/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), **SWITCH 62,5 WG** (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), **ZENBY** (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 14.03.2023 21:23

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

