

9. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 14.03.2023 21:25 - Zaključeno



Brsti breskev in nektarin so se začeli razpirati. Na zgodnjih legah so vidni posamezni cvetni popki (53 – 55 po lestvici BBCH).

V deževne vremenu je nevarnost okužb z **breskovo kodravostjo** velika. Nadaljevati je potrebno s preventivnim varstvom. Če so zeleni deli brsta še vedno zakriti, lahko uporabite pripravke na osnovi bakra, ki varujejo tudi pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** in **bakterijskimi okužbami**: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), BADGE WG (3,5 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), NORDOX 75 WG (2 kg/ha; proti breskovi kodravosti). Poleg naštetih ima od 15.03.2023 do 14.07.2023 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe tudi pripravek CURATIO žvepleno apnena brozga (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje). Na zgodnejših legah, kjer so opazni zeleni deli brsta in cvetne zasnove, je potrebno uporabiti sredstvo **SYLLIT 400 EC** (2,25 l/ha; uporabi se ga lahko največ 2 × v eni rastni dobi, v presledku najmanj 7 dni).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 14.03.2023 21:25

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

