

16. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 2 - 15.03.2023 14:11 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan in hrušk so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo C – C₃ po Fleckingerju oz. BBCH 53 - 54 (odpiranje brsta – stadij mišjega ušesca).

Pregled zimskih plodišč **JABLANOVEGA ŠKRLUPA** je pokazal, da so askospore v posameznih plodiščih že dozorele. Do prvih primarnih okužb lahko pride le v primeru, če bo zaradi padavin listje in že odprti brsti mokri daljši čas (pri povprečni temperaturi 8 °C - 20 ur) in to predvsem v nasadih, kjer lanskoletno listje iz nasada ni bilo odstranjeno – pometeno in kjer so jablane dosegle zgoraj omenjeno fenološko fazo.

V primeru vremenske napovedi z obilnimi padavinami (nad 10 L/m²) je potrebno poškropiti jablane, ki so v razvoju hitreje in to še **pred** napovedanimi padavinami. Priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov:

- Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha),
- Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha),
- Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha),
- Kocide 2000 (2 kg/ha).

Vsi našeti bakrovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Na nekaterih lokacijah smo že našli prva odložena jajčeca **JABLANOVEGA CVETOŽERA**. V prihodnjih dneh pričakujemo povečano število odloženih jajčec.

Ponovno priporočamo pregled nasadov, predvsem tistih, kjer je škoda v preteklih letih že bila ugotovljena in nasadov v bližini gozdov. Priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste – prag škodljivosti je presežen kadar je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku).

V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti priporočamo uporabo pripravka **Asset five**, ki ima v letošnjem letu dovoljenje za nujne primere za zatiranje jablanovega cvetožera na jablanah. Uporablja se v 0,064 % koncentraciji (0,96 L v 1500 L vode na ha) v začetku brstenja jablane (razvojna faza B – C₃, oz. BBCH 51 – 54), ob prisotnosti škodljivih žuželk. Na istem zemljišču se lahko tretira **NAJVEČ** dvakrat. Tretiranje se po potrebi ponovi 7 dni po predhodnem. S sredstvom se tretira zvečer, oziroma v najhladnejših urah dneva. **Priporočeni pH škropilne brozge je od 5 do 6.** Škropilno brozgo je zato treba po potrebi zakisati z dodatkom citronske kisline (ekološka vzgoja) ali sredstva Pekacid. Sredstvo se ne meša se sredstvi alkalne pH reakcije (npr. bordojsko brozgo). Glede mešanja z drugimi sredstvi se je treba posvetovati z zastopnikom za sredstvo.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 15.03.2023 14:11

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: Lešnik Leonida

Pripravila: **Leonida Lešnik**

Seznam registriranih FFS

