



8. VARSTVO PEČKARJEV - 20.03.2023 11:02 - Zaključeno



Stopnja fenološkega razvoja jablan in hrušk je zelo različna in odvisna od sorte in lege. Na večini opazovanih lokacij so jablane in hruške v fazi brstenja. Zgodnje sorte hrušk na izredno toplih lokacijah pa že dosegajo stadij rožnih popkov (57 BBCH).

Trosišča gliv jablanovega škrlupa so zrela, tako ob prvih padavinah pričakujemo sproščanje askospor in posledično prve okužbe. Zato je pomembno, da pred padavinami poškopite nasade in zaščitite odpirajoče se brste. V času brstenja je primerna uporaba sredstev na osnovi bakra kot so **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35**, **Cuprablau Z 50 WP**, **Kocide 2000**. V nasadih, kjer so se v preteklosti pojavile okužbe z bakterijo hruševega ožiga lahko uporabite tudi bakrova pripravka **Nordox 75 WG** ali **Badge WG**.

Za zatiranje sesajočih škodljivih organizmov (kaparji, rdeča sadna pršica in listne uši), ki prezimijo na lesu v obliki jajčec ali ličink, je v tem času primerna uporaba oljnih pripravkov kot so: **Ovitex**, **Frutapon**, **Belo olje karsia**, **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat**. Največja učinkovitost delovanja oljnih pripravkov je v oblačnem vremenu, pri visoki relativni zračni vlagi.

V ekoloških nasadih je od razvojne faze »mišje uho« možna uporaba pripravka **Curatio žvepleno apnena brozga**, ki ima dovoljenje za nujne primere. Sredstvo je namenjeno obvladovanju bolezni kot so jablanov škrlup, listne pegavosti, jablanova pepelovka in mušja pegavost plodov.

Pridelovalcem svetujemo naj pregledujejo brste na prisotnost jablanovega cvetožera. Še posebno bodite pozorni v nasadih, ki ležijo v bližini gozdov ali v nasadih, v katerih ste imeli težave v preteklih letih. Toplo vreme omogoča hiter razvoj škodljivca, tako v sadovnjakih opazamo nabodene brste ter tudi že prva odložena jajčeca. Prag škodljivosti je presežen kadar je nabodeni več kot 15 % brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) ali 30 % (pri močnem nastavku), oziroma so na več kot 15 % pregledanih brstov odložena jajčeca. Pri metodi stresanja je prag presežen, če ulovimo 20 do 30 hroščkov /100 vej. V primeru, da je prag škodljivosti presežen svetujemo škropljenje s sredstvom **Asset five**. Škropljenje opravite v večernih urah, po potrebi lahko škropljenje ponovite v razmaku sedmih dni.

Za odvrčanje sesajočih žuželk kot so hruševe bolšice, je v času brstenja hrušk priporočena uporaba **kaolinskih glin**. Nanos je potrebno večkrat ponoviti, predvsem v primeru padavin.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte. Pri nanosom sredstev nevarnih čebelam obvezno odstranitev cvetočo podrast in škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih.

Datum objave obvestila: 20.03.2023 11:02

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

