9. ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH - 20.03.2023 11:11 - Zaključeno

Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske so ozimna žita sedaj pretežno še v fazi razraščanja, v toplejših legah osrednje Slovenije prehajajo v fazo kolenčenja ali že kolenčijo. Posevki so večinoma dobro razraščeni, nekateri so zelo gosti, dobro pa so razviti tudi pleveli. Širokolistni kot so njivska vijolica, jetičniki, smolenec ipd. so večinoma v fazah razvoja stranskih poganjkov, mrtva kopriva oblikuje popke, enoletne trave se razraščajo. V gostih posevkih so pleveli že dobro prekriti z žitom, v manj razvitih so še dobro vidni med rastlinami žit. Priporočamo, da pregledate posevke in ukrepate po potrebi. Kjer so tla dovolj suha je sedaj še čas za mehansko prečesavanje žit. Ukrep je še posebej priporočljiv v zelo gostih posevkih.

Sicer pa izberite ustrezen herbicid ali njihove kombinacije, s katerimi boste najbolje zatrli prevladujoče plevele v posevku, ob upoštevanju razvoja žita in okoljskih razmer. Nekatera sredstva je treba uporabiti do konca razraščanja žit, nekatera lahko rabite med kolenčenjem, ko so pleveli v fazi intenzivne rasti. Učinkovitost ukrepa je praviloma boljša dokler so pleveli manjši in so žitom manj konkurenčni. Učinkovitost sredstev je odvisna tudi od okoljskih dejavnikov, zlasti temperature in vlage, prav tako ni priporočljivo izvajati škropljenj takrat, kadar so rastline v stresu bodisi zaradi suše, nizkih temperatur, bolezni ali drugih dejavnikov. V spodnji tabeli so navedeni pripravki, registrirani za spomladansko rabo v žitih.

Pred škropljenjem natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Tabela: Herbicidi za spomladansko zatiranje plevelov v žitih

Pripravki aktivna snov	Odmerek (kg, l/ha)	Registracija in čas rabe	Pleveli
Adentis, Corida, Flame, tribenuron-metil	0,02	P, J od prvega kolenca in najpozneje do zastavičarja (BBCH 31-39)	EŠ
Alister new diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron	1	P Zgodaj spoml., od dveh l. do konca razraščanja (BBCH 12-29)	Š in O
Alliance diflufenikan + metsulfuron metil	0,1	P, J po vzniku, od prvega l. do konca razraščanja (BBCH 10-29)	EŠ
Ally SX, **Finy, Savvy** metsulfuron-metil	0,03	P, J, Pi, O, R, T jara ž.: od drugega l. do zastavičarja (BBCH 12-39); oz. ž.: od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21- 39)	EŠ
Arrat dikamba + tritosulfuron	0,2	P, J	Š
Atlantis star jodosulfuron + mezosulfuron + tienkarbazon-metil	0,2 - 0,33	P, T od treh l. do drugega kolenca (BBCH 13-32)	O in Š
Axial pinoksaden	0,6 - 1,2	P, J od treh l. do zastavičarja (BBCH 13-39)	EO
Axial one florasulam + pinoksaden	1 - 1,3	P, J od prvega l. do faze, ko je viden zastavičar (BBCH 11-37)	Š in O
Basagran 480 bentazon	2,0	P, J, O, R, T od razraščanja do začetka kolenčenja (BBCH 21-31)	Š
Biathlon 4D florasulam + tritosulfuron	0,07	P, J, Pi, R, T od tretjega l. do razvitega zastavičarja (BBCH 13 do 39)	Š
Boudha metsulfuron + tribenuron	0,02	P, J, R, T (O: manjše uporabe) od razraščanja in najpozneje do zastavičarja (BBCH 21-39)	EŠ
Flurostar 200, Starane forte, Tandus 200 EC fluroksipir	0,6 - 0,8	P, J, R, T od dveh razvitih l. do zastavičarja (BBCH 12-39)	EŠ in VŠ
Clyde FX, Flurostar super florasulam + fluroksipir	1,5	P, J, O, R, T od šest stranskih poganjkov do zastavičarja (BBCH 26-39)	Š
Valentia florasulam + fluroksipir	1,2 – 1,6	P, J, O, R, T od treh l. do pozne faze nabrekanja l.nožn. (BBCH 13-45)	Š
Corello duo florasulam + piroksulam	0,170 - 0,265	P, Pi, R, T od začetka razraščanja do faze prvega kolenca (BBCH 21-31)	O in Š

Flyer florasulam	0,1-0,15	P, J, R od treh razvitih listov do zastavičarja, (BBCH 19-39)	Š
Duplosan KV mekoprop – P	2,0	P, J, od razraščanja do kolenčenja (BBCH 21-31)	Š
Duplosan KV 600 mekoprop – P	1,5	P, J, O, R, T med razraščanjem žit (BBCH 13-29)	
U 46 M-Fluid MCPA-DMA	1,0	P, J, R, T od 3 stranskih poganjkov do zastavičarja (BBCH 23 - 39)	EŠ, VŠ
Esteron 2,4-D 2-EHE	0,75 - 1,0	P, J, T Od konca razraščanja do drugega kolenca (BBCH 22-32)	EŠ
Grodyl amidosilfuron	0,04	P, J, Pi, O, R, T od treh listov do začetka pojavljanja zgornjega lista (BBCH 13-37)	Š
Herbocid XL 2,4-D	1,25	P, J, R, T od sredine razraščanja do konca razraščanja (BBCH 24-29)	EŠ in VŠ
Hussar OD jodosulfuron	0,2	P, J, R, T od faze treh listov do drugega kolenca (BBCH 13–32)	EŠ in VŠ
Hussar star jodosulfuron + tienkarbazon-metil	0,2-0,3	P, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	EŠ in EV
Lector delta diflufenikan + florasulam	0,075 – 0,1	P, J, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Š
Mustang 306 SE 2,4 D + florasulam	0,4 – 0,6	P, J, T od začetka razraščanja do prvega kolenca (BBCH 21-31)	EŠ
Mustang forte 2,4 D + aminipiralid + florasulam	0,8 – 1,0	P, J, O, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Š
Pallas 75 WG piroksulam	0,12 – 0,25	P, R, T od faze dveh listov do drugega kolenca (BBCH 12-32)	O in Š
Quelex flurasulam + halauksifen-metil	0,05	P, J, Pi, R, T spomladi od faze začetnega razraščanja do faze drugega kolenca (BBCH 21-32)	Š
Sekator OD amidosulfuron + jodosulfuron	0,15	P, J, R, T oz. ž.: tretji l. do začetka razv. zastavičarja (BBCH 13-37); jara ž.: tretji l. do konca razraščanja (BBCH 13-29)	EŠ, EO in VŠ
Sekator plus 2,4-D + amidosulfuron + jodosulfuron	0,6	P, J, R, T	Š
Xanadu bensulfuron + metsulfuron	0,1	P, J, O, R, T oz. ž. : od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21-39); jara ž.: od tretjega lista do zastavičarja (BBCH 13-39)	Š

P-pšenica, J-ječmen, Pi-pira, O-oves, R-rž, T-tritikala

Š-širokolistni, O-ozkolistni, EŠ-enoletni širolkolistni, EO-enoletni ozkolistni, VŠ-večletni širokolistni

Datum objave obvestila: 20.03.2023 11:11
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Meta
Pripravila: **Meta Zemljič**
Seznam registriranih FFS