14. VARSTVO MARELIC - 23.03.2023 10:19 - Zaključeno



Marelice prehajajo s fenološke faze polnega cvetenja v fazo intenzivnega odpadanje venčnih listov (BBCH 65 – 67). Pred napovedanimi padavinami ob koncu tedna opravite škropljenje proti **cvetni moniliji** z enim od pripravkov, ki so navedeni preglednici.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Prolectus	330 g na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Revyona	1,8 L/ha
Signum	0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,6 WG	0,08%, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Zenby	0,9 L/ha
Amylo-X	1,5 do 2,5 kg/ha
Serenade ASO	8 L/ha
Prestop	0,2-0,4 % oz. 2 kg/ha

Pripravki na osnovi mikroorganizmov Amylo-X, Serenade ASO in Prestop imajo dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Datum objave obvestila: 23.03.2023 10:19
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**
Seznam registriranih FFS