



24. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 24.03.2023 09:58 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Toplo vreme v preteklem tednu je pospešilo fenološki razvoj rastlin. Nasadi zgodnjih sort češenj prehajajo v fenofazo cvetenja. Ko bo odprtih 10 % cvetov je potrebno opraviti škropljenje proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite registrirane pripravke, ki so navedeni v spodnji preglednici.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Amylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha
Duaxo koncentrat	V odmerku 15 ml/5l vode oziroma v odmerku 1,1 l na višinski meter krošnje/ha. Najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3 l/ha.
Luna experience	0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)
Prestop	2 kg/ha; 0,2-0,4 %
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha
Revyona	1,8 l/ha
Serenade Aso	8 l/ha
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; odmerek posameznega škropljenja ne sme preseči 1 kg/ha
Taegro	0,185-0,37 kg/ha
Teldor SC 500	0,5 l/ha na 1 m višine krošnje na ha (največji skupni odmerek 1,5 l na ha)
Zenby	0,9 l/ha

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvrčalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 24.03.2023 09:58

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

