



26. OBVESTILO O VARSTVU OLJK - 24.03.2023 13:48 - Zaključeno



Pavje oko in oljkova siva pegavost

Po opravljeni rezi je priporočljivo, da oljčnike preventivno poskropite proti glivični bolezni **pavje oko**. Za prvo škropljenje priporočamo uporabo sredstev na osnovi **bakra**.

Za zatiranje bolezni so registrirani naslednji pripravki:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK
- bakrov oksiklorid	Cuprblau-Z 35	1,6-2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	WG	2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	Cuprblau-Z 35	1,4 kg/ha
- bakrov oksid	WP	1,25 kg/ha
- dodin	Cuprblau-Z 50	2,25l/ha
- tebukonazol + trifloksistrobin	WP	0,25 kg/ha
- difenkonazol	Nordox 75 WG	0,5 l/ha
- <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Syllit 400 SC	8 l/ha
- <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Nativo 75 WG	0,185 do 0,37
	Score 250 EC	kg/ha
	Serenade ASO	
	Taegro	

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena uporaba pripravkov na osnovi bakra in sredstva na osnovi mikroorganizmov - *Bacillus amyloliquefaciens*. Značilna bolezenska znamenja pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi zlasti Istrska belica in Oblica.

Glavni znaki **oljkove sive pegavosti** so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino). Pripravki na osnovi bakra delujejo proti obema boleznima, sočasno razkužijo rane nastale ob rezi ter ovirajo razvoj bakterioze, povzročiteljice oljkovega raka (*Pseudomonas savastanoi*).

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Glivične bolezni lesa oljk

Leta 2021 smo na vzorcu oljke iz Slovenske Istre potrdili najdbo glive *Phaeoacremonium scolyti*. Gre za polifagno vrsto, ki je bila v tujini predhodno že opisana na vinski trti ter na drugih lesnatih rastlinah (*Prunus*, *Pyrus*,...). Značilna bolezenska znamenja za omenjeno glivo so sušenje in odmiranje vej ter nekroze na lesu. Ker okužbe povečini potekajo preko ran je priporočljivo, da se po opravljeni rezi opravi škropljenje oljčnika. Zaradi širokega spektra delovanja po zimski rezi priporočamo uporabo **bakrovih pripravkov**, ki so registrirani za zatiranje pavjega očesa.

Med dodatne ukrepe s katerimi omejimo pojav glivičnih bolezni lesa na oljkah so tudi izrezovanje in uničenje vej z bolezenskimi znamenji. Poleg tega je še priporočljivo, da se rez izvaja v suhem vremenu.

Datum objave obvestila: 24.03.2023 13:48

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

