



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Oljna ogrščica
/ 18. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI

18. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI - 24.03.2023 14:51 - Zaključeno



Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije na večini lokacij v fenološkem razvoju pojava socvetja (50 – 55 po BBCH).

Zatiranje škodljivcev repičarja (*Meligethes aeneus*) in repičnega kljunotaja (*Ceutorhynchus napi*)

Prag škodljivosti za **repičarja** je presežen, kadar imamo povprečno na posameznih rastlinah 1-2 hrošča v času razpiranja brstov (brsti zavarovani z lističi), ali kadar imamo 2-3 hrošče na rastlino v času nabreklih cvetnih brstov ali 4-6 hroščev na rastlino v času nekaj dni pred razcvetanjem prvih cvetov.

Uporaba insekticidov je smiselna in smotrna le v primeru, da imate v svojih posevkih presežen prag škodljivosti.

Trenutno so na voljo naslednji registrirani insekticidi:

PRIPRAVEK	ODMEREK	OPOMBE / št. dovoljenih tretiranj
DECIS 100 EC	63 ml/ha	K / 1
DECIS 2,5 EC	0,3 L/ha	K / 2
DELUX 050 CS	0,1 L/ha	K / 1
EVURE	0,2 L/ha	K / 1
KARATE ZEON 5 CS	0,15 L/ha	K / 2
MAVRIK 240 EW	0,2 L/ha	K / 1
POLECI	0,3 L/ha	K / 2

Hroščki **repičarja** se prehranjujejo s cvetnim prahom. Ker se na posevkih pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo samo na način, da raztrgajo cvetove.

K: kontaktni pripravek.

Zatiranje glivičnih bolezni

Z napovedanimi padavinami se bodo povečale tudi možnosti okužbe z glivičnimi boleznimi v oljni ogrščici: suha trohnoba stebela ogrščice (*Phoma lingam*), bela zrnata gniloba (*Sclerotinia sclerotiorum*) in črna pegavost (*Alternaria brassicae* spp.).

Na podlagi vremenskih pogojev, zdravstvenega stanja posevka in fenološkega razvoja se odločite za uporabo enega od priporočenih pripravkov.

SREDSTVO	ODMEREK	DELUJE NA	PRIPOROČEN ČAS UPORABE
FOLICUR EW 250 ORIOUS 25 EW	1 L/ha	Zatira: belo gnilobo Zmanjšuje okužbo s: črno listno pegavostjo in suho trohnobo	Od začetka rasti stebela do konca cvetenja (BBCH 30 - 69).
BOUNTY	0,6 L/ha	Zatira: belo gnilobo	Od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60 - 65).
BUZZ ULTRA DF	0,33 kg/ha	Zatira: belo gnilobo	Od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60 - 65).
CARAMBA PLEXEO	1,2 L/ha	Zmanjšuje okužbe s: suho trohnobo	Od začetka rasti do začetka cvetenja

SIRENA			posevka (BBCH 30 - 69)
CHAMANE NORIOS	1 L/ha	Zatira: belo gnilobo Zmanjšuje okužbe s: pegavostmi iz rodu <i>Alternaria</i>	Ko je odprtih 10 % cvetov do konca cvetenja (BBCH 61 - 69)
CUSTODIA	1 L/ha	Zmanjševaje okužb z: belo gnilobo	Ko je odprtih 10 % cvetov do polnega cvetenja (BBCH 61 - 65)
MAVITA 250 EC SCORE 250 EC	0,5 L/ha	Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost	Od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69)
ORTIVA TAZER 250 SC ZAFTRA AZT 250 SC	1 L/ha	Zmanjšuje okužb s: črno listne pegavostjo, suho trohnobo in belo gnilobo	Prvi cvetovi odprti, do konca cvetenja (BBCH 60 - 69)
MIRADOR FORTE	1,5 do 2 L/ha	Zatira: črno listno pegavost, suho trohnobo in belo gnilobo	Od začetka rasti stebel do konca cvetenja (BBCH 30 - 69)
PRAKTIS	0,7 L/ha	Zmanjševanje okužb: bela gniloba	od razvojne faze začetka rasti stebela do faze konca cvetenja (BBCH 30 - 69)
PECARI 300 EC PROCER 300 EC PROMINO 300 EC ERA (staro ime TARTAROS 300 EC) CACTAI TARTAROS	0,6 L/ha	Zmanjšuje okužbe z: suho trohnobo, belo gnilobo	od razvojne faze ko je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje, do konca cvetenja (BBCH 61-69)
PROPULSE	1 L/ha	Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost Zmanjšuje okužbe z: belo gnilobo	Od 4 razvitega lista, do faze, ko je 30% luskov doseglo končno velikost (BBCH 14 - 73)
PROTENDO 300 EC	0,6 L/ha	Zmanjševanje okužb s: suho trohnobo Zmanjševanje okužb z: bela gniloba ter črno listno pegavost	od razvojne faze šest listov razvitih do faze rumenega brsta, ko so vidni prvi venčni listi (BBCH 16-59) od razvojne faze začetka cvetenja do faze konca cvetenja (BBCH 61-69)
REYONA	1,5 L/ha	Za zatiranje suhe trohnobe	Od tretjega lista razgrnjenega, do faze, ko so individualni cvetni

			brsti (glavno socvetje) vidni, vendar še vedno zaprti (BBCH 13-55).
ROYALTY	0,5 kg/ha	Zmanjševanje okužb z: belo gnilobo in črno listno pegavostjo	od razvojne faze pojava socvetja do konca cvetenja (BBCH 55-69)
SISAM	0,8 L/ha	Zatira: belo gnilobo	Ko so odprti prvi cvetovi do konca cvetenja (BBCH 60 - 69)
VELOSTAR	1 L/ha	Za zmanjševanje okužb bele gnilobe in črne listne pegavosti	od začetka cvetenja, ko so prvi cvetovi odprti, do faze konca cvetenja (BBCH 60-69)
TEBUSHA 25% EW	1 L/ha	Zatiranje: suhe trohnobe	od pojava cvetnih popkov do polnega cvetenja (BBCH 55-65)
ZENBY	0,8 L/ha	Delno zmanjšuje okužbe: belo gnilobo	Polno cvetenje (BBCH 60 – 65)

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 24.03.2023 14:51
 Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
 Objavil/a: RODIČ Karmen
 Uredila: **Karmen Rodič**
 Seznam registriranih FFS