

22. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 25.03.2023 18:31 - Zaključeno



Brsti breskev in nektarin so v razvoju zelo napredovali. Vidni so posamezni cvetni popki, na zgodnjih legah prehajajo v cvetenje (59 – 61 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred **breskovo kodravostjo** svetujemo **SYLLIT 400 SC** (2,25 l/ha; uporabi se ga lahko največ 2 × v eni rastni dobi, v presledku najmanj 7 dni).

V primeru deževnega vremena priporočamo v času cvetenja ukrepanje proti **cvetni moniliji**. Uporabite lahko: **AMYLO-X** (1,5 do 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha), **LIBRETO** (1 l/ha), **PRESTOP** (2 kg/ha), **PROLECTUS** (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), **REYONA** (1,8 l/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), **ZENBY** (0,9 l/ha), **SWTCH 62,5 WG** (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha),... Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 25.03.2023 18:31

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

