

23. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 25.03.2023 18:32 - Zaključeno



Nasadi češenj so tik pred cvetenjem. Pridelovalcem svetujemo varstvo **pred cvetno monilijo**. Nevarnost okužbe je večja v primeru deževnega vremena. Priporočamo dvakraten nanos; prvič ob začetku cvetenja (odprtih 10% cvetov) in ob zaključevanju (odpadanje venčnih listov). V poštev pridejo sredstva:

AMYLO-X (1,5 do 2,5 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (0,6 l/ha, oz. 1,1 l na višinski meter krošnje), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha), **PRESTOP** (2 kg/ha), **PROLECTUS** (330 g sredstva na višinski meter krošnje, oz. največ 1 kg/ha), **REYONA** (1,8 l/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha, oz. največ 0,75 kg/ha), **SWITCH 62,5 WG** (0,08% koncentracija, oz. največ 1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (0,5 l na 1 m višine krošnje, oz. največ 1,5 l/ha), **ZENBY** (0,9 l/ha). Sredstva Amylo X, Serenade Aso in Prestop so dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 25.03.2023 18:32

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

