

32. OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ - 06.04.2023 15:04 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)

Na območju Brkinov so nasadi sliv in češpelj v fenofazi BBCH53. Pred padavinami je priporočljivo, da opravite zatiranje **listne luknjičavosti koščičarjev**.

Za škropljenje uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

V letošnjem letu je dovoljenje za nujne primere pridobilo sredstvo Curatio žvepleno apnena brozga na osnovi kalcijevega polisulfida (apneno žveplo). Omenjen pripravek se uporabi v odmerku 6 l na ha na meter višine krošnje.

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 % Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 06.04.2023 15:04
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: **Marko Devetak**
Seznam registriranih FFS