

34. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 06.04.2023 15:21 - Zaključeno



V večjem delu Vipavke doline so hruške že v polnem cvetenju (BBCH 65), cveteti pa so začele tudi nekatere zgodnje sorte jablan (BBCH 61-62). Ostale sorte jablan so še v fenološki fazi rožnatih popkov oz. balonskega stadija (BBCH 57-59). V Brkinih in na Tolminskem so jabolane povečini v fazi rožnatih popkov (BBCH 57), na boj hladnih oz. višjih legah pa šestadiju vidnih cvetnih popkov (BBCH 55).

Ob zadnjih padavinah so bili na Vipavskem izpolnjeni pogoji za blage do srednje močne okužbe s škrlupom, na objektih stekelcih smo ujeli manjše število askospor. Ob koncu tedna so zopet napovedane padavine, zato je potrebno nasade ponovno preventivno poškropiti. V cvetočih nasadih jablan in hrušk svetujemo uporabo kombinacije kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi ditianon in anilinopirimidinskih pripravkov, v nasadih ki še ne cvetijo pa uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi metiram (Polyram), dodin (SYLLIT 400 SC, SYLLIT 544 SC) ali ditianon WG (DELAN PRO, ALCOBAN).

Sredstvo	Aktivna snov	Odmerek, konc.
Polyram DF	metiram	2,0 kg/ha
Syllit	dodin	1,9 L/ha
Syllit 544 SC	dodin	1,4 L/ha
Delan pro	ditianon + kalijeve fosfonati	2,5 L/ha
Alcoban	ditianon	0,75 kg/ha
Anilinopirimidinski fungicidi		
Chorus 50 WG	ciprodinil	0,45 kg/ha
Pyrus 400 SC	pirimetanil	1 L/ha
Mythos	pirimetanil	1,5 L/ha
Scala	pirimetanil	1,125 L/ha
Batalion 450 SC	pirimetanil	0,7 -1 L/ha
Faban	pirimetanil + ditianon	1,2L/ha

Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V obdobju pred cvetenjem jablan proti pepelovki priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla v najvišjem dovoljenem odmerku 5 - 8 kg/ha. Ukrep priporočamo zlasti na območju Brkinov, kjer imate velike težave z omenjeno boleznijo. Uporabite lahko enega od naštetih pripravkov: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol disperss, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG ali Azumo WG. Uporabite lahko tudi pripravke v tekoči obliki: Pol sulphur 800 SC, Biotip Sulfo 800 SC, Symbiotica Fito v odmerku 6,0 -7,5 L/ha ali Vertipin v odmerku 5L/ha. Uporabo pripravkov na osnovi žvepla priporočamo v toplih dneh, ko temperature zraka presegajo 15 °C.

Jabolčna grizlica (*Hoplocampa testudinea*)

Tik pred cvetenjem je čas za obešanje belih lepljivih plošč za spremljanje jabolčne grizlice. Belo ploščo velikosti 20x30 cm obesimo čim više, na zunanji dobro vidni del krošnje. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Grizlico zatiramo po končanem cvetenju. Termine škropljenja ter dovoljena sredstva bomo objavili v naslednjih obvestilih.

Datum objave obvestila: 06.04.2023 15:21

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS



