

36. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 07.04.2023 11:59 - Zaključeno



Akarinoza (*Calepitrimerus vitis*), erinoza (*Colomerus vitis*), rumena ali gabrova pršica (*Eotetranychus carpini*) in oidij vinske trte (*Uncinula necator*)

Zgodnje sorte vinske trte (Chardonnay) so v fenofazi C po Baggolini-ju oziroma v fenofazi BBCH09. Za zatiranje **pršice trsne kodravosti** in **trsne listne pršice šiškarice** priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Disperss, Microthiol Special, Pepelin, Sulfar, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 8 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

V vinogradih, kjer se je v prejšnjih letih pojavljala **gabrova pršica** ali **rdeča sadna pršica** se v fenološki fazi BBCH 03 (konec nabrekanja brsta: brsti nabrekli vendar še ne zeleni) lahko škropi s pripravkom Red Fox v odmerku 15 l/ha. Z uporabo omenjenega sredstva v odmerku 25-30 l/ha zmanjšamo okužbe s **črno pegavostjo vinske trte**.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 07.04.2023 11:59

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

