

19. VARSTVO OZIMNEGA JEČMENA - 12.04.2023 08:49 - Zaključeno



Ozimna žita so sedaj pretežno v fazi kolenčenja. Ječmeni imajo večinoma razvito prvo do drugo kolence (BBCH 30-32). V mnogih posevkih so opazna znamenja okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo, ki se kažejo kot rjavi mrežasti vzorci na svetlejšem tkivu ali kot podolgaste temne lise, obkrožene z rumenkastimi klorozami. K širjenju bolezni pripomore nestanovitno vreme z menjavanjem obdobji sončnega vremena s padavinskimi obdobji. Priporočamo, da pregledujete posevke in približno ocenite stopnjo okuženosti posevkov.

V obdobju kolenčenja se zatiranje listnih bolezni s fungicidom priporoča, če so bolezenska znamenja opazna na več kot 20 do 30 % rastlin na katerem od najmlajših treh listov. Za prvo zatiranje lahko uporabite katerega od fungicidov kot so **Priaxor EC**, **Revycare**, **Mirador forte**, **Delaro forte**, **Verben**, **Retengo** ali sredstva na osnovi azoksistrobina kot so **Amistar**, **Chamane**, **Ortiva** in podobni. Škropljenje opravite ob mirnem vremenu, nočne temperature naj ne bodo pod ničlo. Po preteku približno dveh tednov bo potrebno škropljenje ponoviti.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 12.04.2023 08:49

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Meta

Pripravila: **Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

