

42. VARSTVO VINSKE TRTE - 20.04.2023 14:56 - Zaključeno



Vinska trta nadaljuje z brstenjem. Razvoj lahko sledimo vse od brstov v stadiju volne do na zgodnjih legah razvitega tretjega lista (05-13 po lestvici BBCH).

Z odganjanjem mladik (velikost cca 2 cm) svetujem ob deževnem vremenu varstvo proti **črni pegavosti vinske trte**.

Uporabite lahko: **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **POLYRAM DF** (3 kg/ha), kar ponovite čez 7 do 10 dni, ko bodo mladike velike že 10-12 cm. Od odpiranja brstov do tretjega razvitega lista je v odmerku 3 kg/ha možna tudi raba **pripravkov na osnovi bakra**: CUPRABLAU Z 35 WG, CUPRABLAU Z 35 WG; slednji so sprejemljivi v ekološki pridelavi.

Topli dnevi s temperaturami nad 15°C omogočajo rabo žveplovih pripravkov: **THIOVIT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL** / ali **DISPERSS**, **PEPELIN WG**, **SULFAR**, **VINDEX 80 WG**, **VERTIPIN**, ki v odmerku 3 do 8 kg(l)/ha zmanjšajo stopnjo napada **pršic trsne kodravosti (akarinoze)**, **trsne pršice (erinoze)**, učinkujejo na zmanjševanje okužb **črne pegavosti vinske trte** in delujejo proti **oidji vinske trte**.

Na predelih kjer se pojavljajo izraziti napadi **trsne listne pršice šiškarice / erinoza**, je možno uporabiti **VERTIMEC PRO** (0,1 % koncentracija, največji dovoljeni odmerek je 1 l/ha).

Zatiranje fitofagnih pršic je pomembno tudi iz vidika preprečevanja širjenja virusnih obolenj kot je npr. **Grapevine Pinot gris virus (GPGV)**.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 20.04.2023 14:56

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

