

40. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 21.04.2023 12:11 - Zaključeno



Akarinoza (*Calepitrimerus vitis*), erinoza (*Colomerus vitis*), oidij vinske trte (*Uncinula necator*), črna pegavost vinske trte (*Cryptosporella viticola*)

Zgodnje sorte vinske trte (Chardonnay) so v fenofazi E po Baggolini-ju oziroma v fenofazi BBCH13. Za zatiranje **pršice trsne kodravosti** in **trsne listne pršice šiškarice** priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Disperss, Microthiol Special, Pepelin, Sulfar, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 8 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Vinograde, ki so v fenofazi 11-13 po BBCH lestvici oz. je tretji list že razgnet in so okuženi s **črno pegavostjo vinske trte** je sedaj primerno škropiti z naslednjimi fungicidi:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
COSAN	2,5-6,25 kg/ha
CUPRABLAU Z 35 WG	3 kg/ha
CUPRABLAU Z 35 WP	3 kg/ha
FOLLOW 80 WG	1,9 kg/ha
FOLPAN 80 WDG	1,9 kg/ha
KUMULUS DF	2,5-6,25 kg/ha
MICROTHIOL DISPERSS	2,5-6,25 kg/ha
MICROTHIOL SPECIAL	2,5-6,25 kg/ha
MIKAL FLASH	3 kg/ha
MOMENTUM F	3 kg/ha
PEPELIN WG	2,5-6,25 kg/ha
POLYRAM DF	0,3 %; 3 kg/ha
SULFAR	2,5-6,25 kg/ha
THIOVIT JET	2,5-6,25 kg/ha
UNIVERSALIS	2 l/ha
VINDEX 80 WG	2,5-6,25 kg/ha

Na poznih legah kjer je vinska trta še v fenofazi BBCH03 (konec nabrekanja brsta: brsti nabrekli vendar še ne zeleni) za zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vinske trte lahko uporabite pripravek RED FOX v odmerku 25-30 l/ha.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 21.04.2023 12:11

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

