

### 43. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 21.04.2023 15:36 - Zaključeno



#### Marelična pepelovka

Nasadi marelic so v fenološki fazi BBCH71 (Rast plodnice; odpadanje plodičev po cvetenju). Zaradi spremenljivega vremena je priporočljivo opraviti preventivno škropljenje proti **marelični pepelovki**. Zatiranje bolezni lahko opravite s sredstvi na osnovi žvepla. Uporabo pripravkov na osnovi žvepla priporočamo, ko temperature zraka presegajo 15°C.

Pripravki registrirani za zatiranje marelične pepelovke:

| Sredstvo            | Odmerek ali koncentracija          |
|---------------------|------------------------------------|
| Azumo WG            | 7,5 kg/ha                          |
| Biotip Sulfo 800 SC | 6 l/ha                             |
| Cosan               | 5-7,5 kg/ha                        |
| Fytosave            | 2 l/ha                             |
| Kumulus DF          | 5-7,5 kg/ha                        |
| Mavita 250 EC       | 0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha |
| Microthiol Disperss | 5-7,5 kg/ha                        |
| Microthiol Special  | 5-7,5 kg/ha                        |
| Pepelin             | 5-7,5 kg/ha                        |
| Score 250 EC        | 0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha |
| Sercadis            | 0,15 l/ha                          |
| Sulfar              | 5-7,5 kg/ha                        |
| Thiovit Jet         | 5-7,5 kg/ha                        |
| Vertipin            | 5 l/ha                             |
| Vindex 80 WG        | 5-7,5 kg/ha                        |

Za zatiranje marelične pepelovke in listne luknjičavosti koščičarjev na marelicah je bilo izdano dovoljenje za nujne primere za pripravek Curatio žvepleno apnena brozga. Sredstvo se uporablja v odmerku 6 l/ha na meter višine krošnje.

**Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

#### Listne uši

V nasadih moramo biti pozorni na pojav **listnih uši**. Za zatiranje škodljivcev uporabimo enega od spodaj navedenih pripravkov:

| Sredstvo       | Odmerek ali koncentracija                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFINTO         | 0,14 kg/ha                                                                                    |
| MOSPILAN 20 SG | 0,025 % - 0,04 %                                                                              |
| NEEMAZAL-T/S   | 1,5 l/ha (na meter višine krošnje in porabi najmanj 500 L vode na ha na meter višine krošnje) |
| TEPPEKI        | 0,14 kg/ha                                                                                    |

Za zatiranje listnih uši na marelicah je bilo izdano dovoljenje za nujne primere za pripravek Asset five. Sredstvo se uporablja v odmerku 0,96 l v 1500 l vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji.

**Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

### **Mali zimski pedic**

V sadovnjakih prihaja do izleganja gosenic **malega zimskega pedica**. Ob pojavu škodljivih gosenic drevesa škropite z registriranimi pripravkoma Agree WG v odmerku 1 kg/ha ali Neemazal-T/S v odmerku 1,5 l/ha (na meter višine krošnje in porabi najmanj 500 l vode na ha na meter višine krošnje):

**Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 21.04.2023 15:36

Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

