

44. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 21.04.2023 16:16 - Zaključeno



Breskova pepelovka

Nasadi breskev in nektarin so v fenofazi H po Baggioliniju oz. BBCH71 (rast plodnice; odpadanje plodičev po cvetenju). Sedaj lahko opravite preventivno zatiranje **breskove pepelovke**. Za zatiranje priporočamo uporabo sredstev na osnovi **žvepla**.

Registrirana sredstva za zatiranje breskove pepelovke na breskvah:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
AZUMO WG	7,5 kg/ha
BIOTIP SULFO 800 SC	6 l/ha
COSAN	5 – 7,5 kg/ha
CURATIO - ŽVEPLENO APNENA BROZGA-dovoljenje za nujne primere	6 l/ha na meter višine krošnje
FYTOSAVE	2 l/ha
KUMULUS DF	5 – 7,5 kg/ha
MAVITA 250 EC	0,03 % oz. 0,45 l/ha
MICROTHIOL DISPRESS	5 – 7,5 kg/ha
MICROTHIOL SPECIAL	5 – 7,5 kg/ha
PEPELIN	5 – 7,5 kg/ha
POL-SULPHUR 800 SC	6 l/ha
SCORE 250 EC	0,03 % oz. 0,45 l/ha
SERCADIS	0,15 l/ha
SULFAR	5 – 7,5 kg/ha
THIOVIT JET	5 – 7,5 kg/ha
VERTIPIN	5 l/ha
VINDEX 80 WG	5 – 7,5 kg/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Listne uši

V nasadih breskev in nektarin spremljajte pojav **zelene** in **rjave breskove uši**. Škodljivce zatiramo, če je presežen prag škodljivosti.

Prag škodljivosti za posamezno vrsto listnih uši:

Siva breskova uš	3 % naseljenih brstov pred cvetenjem, oziroma 7 % napadenih poganjkov po cvetenju. Za nektarine je tudi po cvetenju prag škodljivosti 3 %
Zelena breskova uš	10% napadenih poganjkov
Črna breskova uš, Rjava breskova uš	7% napadenih poganjkov
Medena breskova uš	prisotnost

Za zatiranje listnih uši na breskvah in nektarinah so registrirani spodnji pripravki:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
----------	---------------------------

AFINTO	0,14 kg/ha
MOSPILAN 20 SG	0,025 % - 0,04 %
NEEMAZAL-T/S	1,5 l/ha (na meter višine krošnje in porabi najmanj 500 L vode na ha na meter višine krošnje)
PIRIMOR 50 WG	0,075 % oz. 0,75 kg/ha
TEPPEKI	0,14 kg/ha

Za zatiranje listnih uši na breskvah je bilo pripravku Asset five izdano dovoljenje za nujne primere. Sredstvo se uporablja v odmerku 0,96 l v 1500 l vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji.

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 21.04.2023 16:16
 Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 Objavil/a: Devetak Marko
 Pripravil: **Marko Devetak**
 Seznam registriranih FFS