

50. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH - 05.05.2023 14:46 - Zaključeno



Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena

Posevki ozimne pšenice so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 30-35). Ozimni ječmen pa je v fazi vidnih prvih resic (BBCH 47) oz. na bolj zgodnjih legah že v sredini klasenja (BBCH 55).

Zatiranje bolezni

Tudi v letošnjem letu beležimo dobro prezimila žita z zelo malo okužbami. Se pa v prihodnje zaradi povečane prisotnosti vlage pričakuje povečan pojav glivičnih bolezni. Pozorni bodite na preseže pragove.

V ječmenu smo v zadnjih letih bolj pozorni na pojav okužb z **ramularijsko pegavostjo ječmena** (*Ramularia collo-cygni*). Priporočamo, da pregledate posevke in uporabite enega izmed naslednjih pripravkov (vsi navedeni zatirajo vse tri glivične bolezni na ječmenu). Škropljenje opravite v začetku klasenja: **ASCRA XPRO** (1,2 L/ha), **CAYUNIS** (1 L/ha), **DELARO FORTE** (1 L/ha), **ELATUS ERA** (1 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **IMTrex XE** (2 L/ha), **LIBRAX** (1,33 – 2,0 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **REVCARE** (1,5 L/ha), **REVYSTAR XL** (1,0 – 1,5 L/ha), **SILTRA XPRO** (tretira se v razvojni fazi, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja (BBCH 31), do vidnih prvih res (BBCH 49)) (1 L/ha) ali **ZANTARA** (1,5 L/ha). Pripravka **REVYSTAR** (1,5 L/ha) in **REVYTREX** (1,125 L/ha) le zmanjšujeta okužbe.

Na pšenici bodite pozorni na presežen prag za **listno pegavost**. Še vedno lahko opravite škropljenje z enim od pripravkov navedenih v prejšnjem obvestilu za varstvo žit:

<http://agromet.mkgp.gov.si/pp/Notices/Details?NoticeID=13559>

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 05.05.2023 14:46

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: Karmen Rodič

Seznam registriranih FFS

