

51. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 05.05.2023 14:57 - Zaključeno



V Vipavski dolini so hruške in jabolane v razvoja in debeljenja plodov (BBCH 71-72), v Brkinih in na Tolminskem so v fazi odcvetanja (BBCH 67-69).

Škrlup

Ob padavinah v začetku tedna so bili izpolnjeni pogoji za močne okužbe s škrlupom. Na objektnih stekelcih smo zabeležili zelo veliko število askospor. Otoplitev je pospešila rast poganjkov in listov, ki so v tem času poleg mladih plodičev zelo občutljivi na okužbe s škrlupom. Priporočamo, da nadaljujete s preventivnim pristopom obvladovanja škrlupa ter nasada pred napovedanimi padavinami ponovno poškropite s kontaktnimi fungicidi. V obdobju nestabilnega vremena dajemo prednost pripravkom na osnovi ditianona oz. pripravkom kot so: Delan 700 WG, Alcoban in Delan Pro, ki imajo daljše kurativno delovanje. Uporabite lahko tudi pripravek Difol, ki ima poleg preventivnega izraženo tudi krajše kurativno delovanje.

Za preventivno zaščito hrušk v tem obdobju svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi ditianona kaptana in metirama ali pripravkov na osnovi fluopirama in fluksapiroksada. Pripravki na osnovi fluopirama (Luna experience in Luna care) delujejo tudi glivo *Stemphylium* sp., povzročiteljico rjave gnilobe plodov hrušk.

V primeru obilnih in dolgotrajnih padavin, ki povzročijo izpiranje škropilne obloge ter omočenost listja več kor 96 ur, v nasadih hrušk in jablan svetujemo uporabo sistemskih (IBE) fungicidov v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi. Škropljenje opravite takoj ko preneha deževati oz. ko razmere to dopuščajo.

Fungicidi za zatiranje škrlupa:

Sredstvo	Aktivna snov	Odmerek, konc.
Delan pro	ditianon + kalijeve fosfonati	2,5 L/ha
Alcoban	ditianon	0,75 kg/ha
Captan 80 WG	kaptan	2,0 kg/ha
Merpan 80 WDG	kaptan	1,88 kg/ha
Orthocide 80 WDG	kaptan	2,0 kg/ha
Scab 80 WG	kaptan	1,9 kg/ha
Scab 480 SC	kaptan	3,13 L/ha
Merplus	kaptan + kalijeve fosfonati	2,0 L/ha
Polyram DF	metiram	2,0 kg/ha
Luna experience	fluopiram	0,75 L/ha
Luna care	fluopiram + fosetil-Al	max. 3,0 kg/ha
Sercadis	fluksapiroksad	0,25 - 0,3 l/ha
Sercadis plus	difenkonazol + fluksapiroksad	1,2 L/ha (oz. 0,7 L/10.000 m ² listne površine)
Difol	difenkonazol + folpet	3,5 L/ha
Sistemični (IBE) fungicidi		
Score 250 EC	difenkonazol	0,2 L/ha
Difcor 250 EC	difenkonazol	0,2 L/ha
	difenkonazol	
Revyona	mefentriflukonazol	1,3 L/10.000 m ² tretirane površine listne stene, pri čemer je največji dovoljeni odmerek 2 L/ha

Jablanova pepelovka (*Podosphaera leucotricha*)

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko lahko uporabite naslednje pripravke: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Luna Care v odmerku 1kg/m višine krošnje (maks. 3,0 kg/ha), Strobby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha ali pripravek Revyona v odmerku 1,3 L/10.000 m² tretirane površine listne stene, pri čemer je največji dovoljeni odmerek 2 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,...) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Microthiol disperss, Vertipin, Pol-Sulphur 800 SG ali Symbiotica Fito) v odmerku 3 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

Jabolčna grizlica, listne uši in krvava uš

Po cvetenju jablan je čas za zatiranje jabolčne grizlice. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. V primeru, da v nasadu ugotovite presežen prag škodljivosti, lahko zoper jabolčno grizlico uporabite pripravek Mospilan 20 SG v 0,04 % konc. ali pripravek Neemazal T/S v odmerku 1,5 L na meter višine krošnje; največji dovoljen odmerek je 4,5 L/ha. Oba pripravka delujeta tudi na listne uši. Za zatiranje listnih uši lahko po cvetenju uporabite tudi pripravek na osnovi aktivne snovi flonikamid Teppeki ali Afinto v odmerku 0,14 kg/ha ali pripravek Pirimor 0,75 kg/ha, ki deluje tudi na krvavo uš.

Jabolčni zavijač (*Cydia pomonella*)

V zadnjih dneh v Vipavski dolini naraščajo ulovi jabolčnega zavijača. Do odlaganja jajčec bo predvidoma prišlo, ko bodo temperature v večernem času (po sončnem zahodu) več dni zapored presegle 15°C. O optimalnem terminu za zatiranje zavijača vas bomo obvestili.

Marmorirana smrdljivka (*Halyomorpha halys*)

V feromonskih vabah opazamo povečane ulove marmorirane smrdljivke, ki se množično preseljuje iz zimskih zatočišč v bližino nasadov koščičarjev in pečkarjev. Na hruškah in jablanah je v tem času redko prisotna, zato ukrepanje proti škodljivki še ni potrebno.

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 05.05.2023 14:57

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

Seznam registriranih FFS

