



42. OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED PLEVELI - 11.05.2023 13:01 - Zaključeno



VARSTVO FIŽOLA PRED PLEVELI

Pridelovalci fižola so v preteklih dneh pričeli s saditvijo fižola, zgodnejši posevki so v zgodnjih fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.

Preglednica 1: Selektivni herbicidi, registriranih v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v nasadih fižola po setvi pred vznikom fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe fižolu BBCH	Karenca in opombe
BOXER O. in Š. pl.	prosulfokarb	EC	5,0 L	Preem	ČU, zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm).
CHANON nekateri vrste E. Š. in O. pl.	aklonifen	SC	3,0 L	Preem, po setvi pred vznikom fižola	ČU, manjša uporaba , v fižolu (za sveže in suho zrnje).
CLOMATE nekateri vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem, od faze suhega semena do vznika korenin BBCH 00-05	ČU, v fižolu (za suho in sveže zrnje ter stročje).
FRESCO E. Š. in O. pl.	metobromuron	SC	2,0 L	Preem	ČU, samo v fižolu za stročje in sveže zrnje. Uporaba za pridelavo fižola za suho zrnje ni dovoljena!
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L	Preem	ČU, manjša uporaba .

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, F – formulacija herbicida, **Preem** – uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** – uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola, **ČU** – karenca je zagotovljena s časom uporabe, **FFS** – fitofarmacevtsko sredstvo.

OPOZORILO: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

Preglednica 2: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v nasadih fižola po vzniku fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
AGIL 100 EC E. in Večl. O. pl.	propakvizafop	EC	0,75 – 1,5 L	Po, BBCH 13-29	60 dni.
*BASAGRAN 480 , E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	S	2,0 L v deljeni (split) aplikaciji (1,0 + 1,0 L), med aplikacijama 7-14 dni	Po, do višine posevka največ 5 cm	ČU, uporaba pri temperaturah do 25 °C! fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje).
FOCUS ULTRA			2,0 L oz. 1,0 L + 1,0 L močila Dash HC		56 dni fižol v zrnju (suh), 28 dni fižol v stroku, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-)

