

44. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.10 - 12.05.2023 14:15 - Zaključeno



Sorte jabol, ki so v razvoju hitreje ('Idared', 'Jonagold', ...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: konec cvetenja (69 po BBCH skali) do plodiči večji od 10 mm (71 po BBCH skali).

Ob zadnjih padavinskih obdobjih smo v Mariboru zabeležili močne izbruhe askospor **jablanovega škrlupa**. Pri tem so bili na sadjarskih lokacijah izpolnjeni pogoji za dve močni primarni okužbi z jablanovim škrlupom. Ob naslednjih padavinah lahko ponovno pričakujemo izbruhe askospor, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlupu** priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF** – 2 kg/ha) ali pripravka na osnovi ditianona (**Delan 700 WG** - 0,75 kg/ha, **Delan pro** – 2,5 L/ha, **Alcoban** – 0,75 kg/ha) ali pripravke na osnovi kaptana (**Captan 80 WG** – 2 kg/ha, **Merpan 80 WDG** -1,88 kg/ha, **Merplus** - 2 L/ha, **Orthocide 80 WG** – 2 kg/ha, **Scab 80 WG** – 1,9 kg/ha, **Scab 480 SC** – 3,13 L/ha).

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti **takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur**. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov:

| ANILINOPIRIMIDINI | IBE FUNGICIDI |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Batalion 450 SC (0,7-1,0 L/ha) ◦ Faban (1,2 L/ha) ◦ Pyramid (1,125 L/ha) ◦ Pyrus 400 SC (1 L/ha) | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Difcor 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Difol (3,5 L/ha) ◦ Difenzone (0,2 L/ha) ◦ *Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha) ◦ Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Revyona (največ 2 L/ha) ◦ Score 250 EC (0,2 L/ha) |
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ◦ Scala (1,125 L/ha) ◦ Avalon (1,125 L/ha) ◦ Laitane (1,125 L/ha) | |

* Sredstva se v letu 2023 ne tržijo.

Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravkoma Faban in Difol.

V **ekološki pridelavi** je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri **temperaturi nad 15°C** dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

- | | |
|----------------------|---------------|
| ◦ Cosan | ◦ Pepelin |
| ◦ Kumulus DF | ◦ Sulfar |
| ◦ Microthiol dispers | ◦ Thiovit jet |

- Microthiol special
- Vindex 80 WG

V nasadih, kjer je **jablanova pepelovka** močno prisotna, priporočamo dodajanje pripravkov, kot so:

- Luna experience
- *Luna care
- Sercadis
- Sercadis plus
- Stroby WG
- *Zato 50 WG
- Tercel

* Sredstva se v letu 2023 ne tržijo.

Sercadis in Sercadis plus imata delovanje tudi na jablanov škrlup

Ulove metuljkov **jabolčnega zavijača** na feromonskih vabah beležimo na vseh spremljanih lokacijah. O optimalnih terminih zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili.

Opozarjamo tudi na redno spremljanje populacije **rdeče sadne pršice**, **mokaste uši**, **listnih uši** in **krvave uši** ter ob preseženem pragu škodljivosti njihovo zatiranje z enim od dovoljenih pripravkov.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 12.05.2023 14:15

Obvestilo prognozičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

