

45. VARSTVO VINSKE TRTE - 16.05.2023 11:59 - Zaključeno



Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 14 – 15 (4 do 5 razprtih listov), dolžina mladice 8 do 15 cm. Na izpostavljenih legah pa sorte, ki so hitrejšje v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat) prehajajo v fazo BBCH 15 – 17 (5 – 7 razprtih listov).

Peronospora in oidij vinske trte

Na opazovanih lokacijah vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je v zadnjih petih dneh padlo od 60 do 87 mm dežja. Vremenska napoved med 16. in 17. 5. napoveduje ponovno veliko količino dežja, nato pa 18. in 19. 5. povečini suho vreme.

Do 18. 5. se bo iztekla tudi inkubacijska doba na lokacijah (Gabrnik, Virštanj), kjer so bili 7. 5. izpolnjeni pogoji za prvo primarno okužbo s peronosporo vinske trte, do konca tedna pa po izračunih tudi na ostalih lokacijah, kjer so bili pogoji za prvo primarno okužbo izpolnjeni med 14. in 15. majem.

Zato takoj, ko se bodo vremenske razmere ustalile, opravite škropljenje proti peronospori vinske trte z enim z enim od kontaktnih fungicidov kot so: **Delan pro** (3 L/ha), **Folpan 80 WDG** (1,25 kg/ha), **Follow 80 WG** (1,25 kg/ha) ali **Polyram DF** (2,4 kg/ha).

V ekološki pridelavi za zatiranje peronospore uporabite enega izmed pripravkov na osnovi bakra kot so: **Badge WG**, **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35 WP**, **Cupoxat**, **Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**.

Za zatiranje **oidija vinske trte** in temperaturah nad 15 °C, dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so:

Pripravek	Odmerek
Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Microthiol special, Microthiol disperss Thiovit Jet, Vindex 80 WG, Sulfar	3 - 8 kg/ha
Cosavet DF, Močljivo žveplo Karsia DF	3,6 - 8 kg/ha
Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC	4 L/ha
Azumo WG	4 - 8 kg/ha
Vertipin	5 - 7,5 L/ha
Cosinus	8 kg/ha

V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo namesto naštetih pripravkov uporabo pripravka **Universalis** (2 L/ha), ki deluje tako na oidij kot peronosporo in črno pegavost). Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi pripravek **Karathane Gold 350 EC** (0,5 L/ha, ali **Kusabi 300 SC** (0,15 L/ha), ki ga dodate že naštetim kontaktnim fungicidom za zatiranje peronospore.

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktivne snovi folpet kot sta: **Folpan 80 WDG** ali **Follow 80 WG**.

Datum objave obvestila: 16.05.2023 11:59

Obvestilo prognoističnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

