

44. Varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo - 18.05.2023 08:47 - Zaključeno



Sedanje vremenske razmere s pogostimi in obilnimi padavinami so ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Obilna vlaga v tleh namreč omogoča, da se povzročitelj, ki je navzoč v na videz zdravih, latentno okuženih semenskih gomoljih, začne razvijati. Micelij prodira iz gomoljev v poganjke oz. v krompirjeva stebila, jih sčasoma preraste in tkivo začne propadati. Na krompirjevih rastlinah se to odraža v obliki primarnih okužb, za katere je značilen pojav temnih lezij na steblih in propadanje tkiva. Oblikujejo se tudi trosi, s katerimi se bolezen širi po nasadu. Razvoj bolezni poteka hitreje pri višjih temperaturah, zato lahko znamenja okužb pričakujemo najprej v pokritih nasadih krompirja oz., ko se vreme otopli. Pridelovalcem krompirja priporočamo pregledovanje njiv. V primeru odkritja rastlin z opisanimi znamenji primarnih okužb svetujemo, da take rastline izpulite, odložite v PVC vrečo in odnesete z njive. Svetujemo tudi, da nasade preventivno zavarujete s fungicidom, takoj, ko bo možen prehod na njive z mehanizacijo. Priporočamo predvsem rabo fungicidov s sistemičnim delovanjem ali tudi delnim sistemičnim delovanjem, ki prodrejo v notranjost tkiv in so manj podvrženi izpiranju. Če so rastline še majhne lahko uporabite tudi dotikalni fungicid, vendar je treba oblogo obnoviti po vsakem obilnem dežju. V tabeli so navedeni fungicidi, registrirani za zatiranje krompirjeve plesni.

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek l/kg/ha	Karenca dni
Dotikalni			
Polyram DF	metiram	2	21
Banjo, Shirlan 500 SC, Frowncide, Winby	fluazinam	0,4	7
Žignal super	fluazinam + azoksistrobin	0,5	7
Cuprablau Z 35 WG	bakrov oksiklorid	2,1	14
Cuprablau Z 35 WP		3	14
Badge WG	bakrov hidroksid + oksiklorid	3	7
Nordox 75 WG	bakrov oksid	1	14
Dotikalni s posebnim delovanjem			
Ranman top	ciazofamid	0,5	7
Orvego	dimetomorf + ametoktradin	0,8	7
Delno sistemični / translaminarni			
Banjo forte	dimetomorf + fluazinam	1	7
Carial flex	cimoksanil + mandipropamid	0,6	7
Copforce extra	cimoksanil + bakr. hidroksid	2	14
Reboot	cimoksanil + zoksamid	0,45	7
Revus	mandipropamid	0,6	3
Revus top	difenokonazol + mandipropamid	0,6	3
Zovec endavia	bentiavalikarb-izopropil + oksatiapirolin	0,4	7
Cymbal	cimoksanil	0,2 – 0,25	7
Sistemični			
Infinito	propamokarb + fluopikolid	1,2 – 1,6	7
Proxanil 450 SC, Rival duo	cimoksanil + propamokarb hidroklorid	2-2,5	14

Datum objave obvestila: 18.05.2023 08:47

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

Seznam registriranih FFS

