



58. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št. 6 - 30.05.2023 07:20 - Zaključeno



Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 18 - 19 (8 do 9 ali več listov razprtih).

Zaradi bujne rasti vinske trte in napovedanih lokalnih ploh oz. neviht, za preprečitev novih okužb s **peronosporo vinske trte** priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov kot so: **Allum** (2,5 kg/ha) ali **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Cymbal** (0,125 kg/ha) ali **Enervin** (2,5 kg/ha) ali **Fytosave** (2 L/ha, dovoljen v ekološki pridelavi) ali **Folpan Gold** (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2kg/ha) ali **Mikal Flash** (4 kg/ha) ali **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Orondis** (0,16 L/ha) ali **Orondis ultra** (0,67 L/ha) ali **Orvego** (0,8 L/ha) ali **Pergado D** (1,4 L/ha) ali **Pergado F** (1,25 kg/ha) **Pergado SC** (0,6 L/ha) ali **Reboot** (0,4 kg/ha) ali **Revus** (0,6 l/ha) ali **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha) ali **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha) ali **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (2 kg/ha) ali **Zorvec vinabel** (0,6 L/ha) ali **Zorvec Zelavin** (0,16 L/ha).

Priporočamo, da naj presledki med škropljenji ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Uporabiti je mogoče tudi pripravka **LBG-01F34** ali **Soriale LX** v odmerku 4 L/ha (če se uporablja samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi *fol/pet*) ali **Foshield** (1 L/ha) ali **Delan pro** v odmerku 3 L/ha.

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (4 L/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincya F** (2,5 L/ha).

Pripravkom **Allum**, **Cymbal**, **Orondis**, **Pergado SC**, **Revus** in **Zorvec zelavin** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

V **ekološki pridelavi** lahko za zatiranje peronospore uporabite enega izmed naslednjih bakrovih pripravkov: **Badge WG** ali **Cuproxit** ali **Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**.

Nevarnost za pojav **oidija vinske trte** se z otoplitrivjo vremena povečuje. Trenutno se oidiag indeks na posameznih opazovanih lokacijah giblje med 47 pa vse do 76 (vrednost 66 in več predstavlja veliko nevarnost za pojav in razvoj bolezni). Za preprečitev okužb s to boleznijo lahko uporabite enega od naslednjih pripravkov: **Collis SC** (0,4 l/ha) ali **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha) ali **Dynali** (0,65 l/ha) ali **Folicur EW 250** (0,4 L/ha) ali **Fytosave** (2 L/ha, dovoljen v ekološki pridelavi) ali **Karathane Gold 350 EC** (0,5 l/ha) ali **Karbicure** (5 kg/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,15 L/ha) ali **Luna experience** (0,375 l/ha) ali **Luna max** (1 l/ha) ali **Mavita** (0,2 l/ha) ali **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha) ali **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha) ali **Orius 25 EW** (0,4 l/ha) ali **Prosper CS 300** (1 L/ha) ali **Revyona** (2 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Sercadis** (0,15 L/ha) ali **Spirox D** (0,5 l/ha) ali **Talendo** (0,25 L/ha) ali **Talendo extra** (0,08-0,2 l/ha) ali **Tebusha 25% EW** (0,4 L/ha) ali **Topas 100 EC** (0,3 l/ha) ali **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali **Vivando** (0,16 l/ha).

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Azumo WG** (4-8 kg/ha) ali **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Microthiol Disperss** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Vertipin** (5-7,5 L/ha) ali **Cosinus** (8 kg/ha) oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (3,6 -8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

Trenutno v vinogradih najdemo ličinke prvega (L1) stadija **ameriškega škržatka** – prenšalca zlate trsne rumenice. Zaradi nevarnosti insekticidov za čebele vas bomo o času uporabe insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka pravočasno obvestili.

V PRIMERU POJAVA NEURIJ IN TOČE IMAJO PRI ZAŠČITI VINSKE TRTE PREDNOST PRIPRAVKI, KI VSEBUJEJO A.S. FOLPET: (**Sfinga extra WDG**, **Pergado F**, **Folpan Gold**, **Mikal flash in podobni**). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin**, **Basfoliar aktiv** ali **podobnih**. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 30.05.2023 07:20

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: Miro Mešl

Seznam registriranih FFS

