



52. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 01.06.2023 12:42 - Zaključeno



Na območju Celjske in Koroške regije je **jablana** povprečno na opazovane lokacije in sorte v **fenološki fazi BBCH 72** (plodiči večji od 20 mm) in prehaja v fazo sekundarnega odpadanje plodičev **BBCH 73**. **Hruška** je v fenološki fazi **BBCH 73**.

Jabolčni zavijač

V zadnjih sedmih dneh so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na vseh opazovanih lokacijah Celjske regije številčnejši in na posameznih lokacijah presegajo prag škodljivosti (7 do 10 metuljčkov na vabo/teden). Tudi večerne temperature zraka od 20. maja dalje vse dni zapored presegajo 15 °C in ustvarjajo pogoje za parjenje ter odlaganje jajčec.

Tisti, ki boste **prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču opravili s pripravkom Coragen** ali **Voliam** (odmerk: 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek pri enem škropljenju jablan ne sme presegati 270 mL pripravka/ha), **to storite od konca tega do sredine prihodnjega tedna, med 2. in 8. junijem**. Prav tako lahko v tem roku zatiranja za zmanjševanje populacije jabolčnega zavijača uporabite pripravek **Exirel** (odmerek: 50-60 mL/hL oz. največ 0,9 L/ha). Oba pripravka delujeta tako na jajčeca kot izlegajoče ličinke - gosence.

Poleg kemičnih insekticidov priporočamo za slabljenje populacije jabolčnega zavijača dodajanje granuloznega virusa **Madex max** ali **Carpovirusine**.

Rdeča sadna pršica

Pri pregledu listov na prisotnost rdeče sadne pršice na teh prevladujejo jajčeca prve poletne generacije, najdemo pa tudi prve izležene ličinke. V prihodnjih dneh pričakujemo intenzivnejše izleganje ličink prve poletne generacije. Zato bodite pozorni in pregledujte nasade. V primeru, da boste našli 4 do 5 ličink na list, opravite škropljenje z enim od pripravkov kot sta: **Shirudo** - staro ime Masai (0,5 kg/ha) ali **Milbeknock** (0,625 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravek **Knemite SC** (0,625 L/meter višine krošnje) ali **Nissorun 10 WP** (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha).

Škrlup in pepelasta plesen jablan

V nasadih, kjer škrlupa ne najdete podaljšajte razmike med škropljenji na 10 do 14 dni.

V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti.

Zaščita plodov s kontaktnimi fungicidi je zelo pomembna še posebno tam, kjer so na listih pege in je nevarnost sekundarnih okužb velika. **V nasadih, kjer so na listih pege posrbite, da bodo plodovi stalno zaščiteni s fungicidno oblogo in nadaljujte s preventivno zaščito plodov.**

Pri škropljenju dajte zdaj prednost kontaktnim fungicidom osnovi a.s. kaptan: **Captan 80 WG** (2kg/ha) **Merpan 80 WDG** (1,88 kg/ha), **Orthocide 80 WG** (2 kg/ha), **Scab 80 WG** (1,9 kg/ha), **Scab 480 SC** (3,13 L/ha) ali **Merplus** (2 L/ha – letos se ne trži). Lahko uporabite tudi pripravek na osnovi a.s. dodin **Syllit 400 SC** (1,9 L/ha).

Opozorilo: Sredstva Syllit 400 SC se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliamimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.

V ekološki pridelavi se lahko uporabi pripravek **Curatio** – žvepleno apnena brozga, ki deluje tudi na jablanovo pepelovko in ima dovoljenje za nujne primere, smejo ga uporabiti samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala **jablanove pepelovke** dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol specilal**, **Microthiol disperss**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Sulfar** ali **Azumo WG** (od BBCH 69), v odmerku 3 kg/ha oz. 3L/ha.

V nasadih, kjer opazate močnejši pojav jablanove pepelovke dodajte pripravke kot sta: **Luna experience** (0,75 L/ha) ali **Sercadis** (0,25 L/ha). V kombinaciji s kontaktnim fungicidom lahko uporabite tudi pripravek **Sercadis plus**. Za zatiranje jablanove pepelovke lahko uporabite tudi pripravek **Topas 100 EC** (0,5 L/ha). Prav tako bi bila smiselna uporaba kombinacije kontaktnih fungicidov in registriranih pripravkov na osnovi strobilurinov kot so: **Stroby WG** (0,2 kg/ha), **Zato 50 WG** (0,15 kg/ha) ali **Tercel** (2,5 kg/ha), ki pa se v letošnjem letu ne tržijo.

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu, pepelasti plesni in jabolčnem zavijaču velja tudi za hruške.

Toča

V primeru toče opravite škropljenje s pripravki na osnovi aktive snovi kaptan kot so: **Captan 80 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG** ali **Scab 480 SC**.

Datum objave obvestila: 01.06.2023 12:42

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024