



53. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 05.06.2023 15:18 - Zaključeno



Če ste v času pred začetkom zorenja češenj na rumenih lepljivih ploščah ugotovili presežen prag škodljivosti češnjeve muhe (najmanj 1 češnjeva muha/2 lepljivi plošči), je upravičena uporaba insketicida. Uporabite lahko **Exirel** ali **Mospilan 20 SG**. Pri uporabi obeh sredstev bodite pozorni na karenčne dobe. Ekološki pridelovalci lahko uporabite biotični pripravek **Naturalis**, ki nima karenčne dobe. Ob škropljenju je priporočljivo dodajanje beljakovinske vabe **Nutrel**. Ob uporabi beljakovinske vabe je potrebno poškropiti le del krošnje, ki je izpostavljen direktni sončni svetlobi. V krošnje dreves lahko namestite tudi insekticidno vabo **Decis Trap češnjeva muha**, ki privablja škodljivca in zmanjšuje napadenost plodov. Priporočljiva gostota pasti znaša 100 vab/ha.

Zoreče plodove napada tudi plodova vinska mušica, ki odlaga jajčeca v plodove, škodo pa povzročajo ličinke, ki se prehranjujejo v notranjosti plodov in jih spreminjajo v kašasto gmoto. Posledice prehranjevanja ličink so tudi pogostejše okužbe z navadno sadno gnilobo. Trenutne vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj škodljivca. Pridelovalcem svetujemo, da v nasadih češenj in višenj postavijo prehranske vabe s pomočjo katerih lahko spremljajo pojav škodljivca. Prehranske vabe lahko izdelate sami, tako da v 0,5 L plastenko na zgornjem delu zavrtate 4 do 5 luknjic, katerih premer naj ne bo večji od 5 mm in zgornji del plastenke pobarvate z rdečo barvo, ki privablja mušico. V plastenko nalijete 1 dl raztopino jabolčnega kisa in rdečega vina (razmerje 3:1) in dodate čajno žličko sladkorja (1 žličko na liter raztopine). Platenko zaprite in jo obesite v krošnjo na višino 1,5 m od tal. V času dozorevanja plodov redno pregledujte vabe. Za zatiranje škodljivca so registrirana naslednja sredstva: **Exirel**, **Laser plus** in **Asset five**. Več informacij je dostopnih na spodnji povezavi:

<https://www.ivr.si/app/uploads/2023/01/Priporocila-za-zatiranje-PVM-KONCNA.pdf>

Ob pogostih padavinah v času zorenja obstaja nevarnost okužb plodov z navadno sadno gnilobo. Za varstvo lahko uporabite enega izmed registriranih pripravkov kot so **Luna experience**, **Prolectus**, **Libreto**, **Signum**, **Switch 62,5 WG**, **Revyona** ali **Teldor 500 SC**. Ekološki sadjarji imate na voljo pripravke na osnovi mikroorganizmov kot so **Amylo-X**, **Serenade ASO** ali **Taegro**.

Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in karenčne dobe ter jih upoštevajte. Ob uporabi insekticidov odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih!

Datum objave obvestila: 05.06.2023 15:18

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

[Seznam registriranih FFS](#)

